

Abutilon angulatum

synonyma: Abutilon intermedium, Abutilon intermedium var. figarianum, Bastardia angulata, Sida macrophylla

čeleď: Malvaceae

oblasti: Angola, Botswana, Burundi, Čad, Demokratická Republika Kongo (Zair), Eritrea, Etiopie, Gambie, Jižní Súdán, Kamerun, Keňa, KwaZulu-Natal, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretánie, Mosambik, Namibie, Nigérie, Rwanda, Senegal, Somálsko, Súdán, Tanzánie, Transvaal, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste v Africe a Madagaskaru jako bylina nebo keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Povrch je šedě plstnatý. Stonky mají při bázi v průměru 2 - 3cm a v mládí jsou hranaté. Listy jsou široce vejčité, špičaté, vroubkované, dlouhé v extrémech až 23 (i 30)cm, široké 16 (i 25)cm, báze je srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 12cm. Kvete v terminálních i postranních latách, vlastní květy mají stopky délky 1 - 3,5cm, kalich délku 0,6 - 1 (i 1,5)cm s vejčitě 3úhlými, 3úhlými nebo vejčitě kopinatými laloky délky 3 - 4 (i 5)mm, korunní lístky jsou žluté až oranžové, dlouhé (0,9 -) 1 - 1,2 (i 2,2)cm. Plodí po 20 - 30ti ks, vlastní plody jsou dlouhé 0,7 - 0,9 (i 1,2)cm, v průměru mají 5 - 6 (i 8)mm a obsahují 1 semeno délky 2,5mm.

<https://www.rostliny.net/>