

## Crupina vulgaris (Chrpinka obecná)

synonyma: *Centaurea acuta*, *Centaurea crupina*, *Centaurea tenuifolia*, *Crupina acuta*, *Crupina alpestris*, *Crupina brachypappa*, *Crupina crupinastrum* subsp. *brachypappa*, *Crupina oligantha*, *Crupina pauciflora*, *Cyanus lanceolatus*, *Serratula crupina*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Idaho, Írán, Itálie, Jižní Austrálie, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Krym, Massachusetts, Oregon, Slovensko, Švýcarsko, Ťan-šan, Washington

Roste v jižnějších částech Evropy, jižním Rusku, Krymu a zavlečena byla i do Severní Ameriky a Jižní Austrálie. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (0,08 -) 20 - 70 (i 90)cm. Lodyha je přímá, větvená v horní části. Přízemní listy jsou podlouhlé a nedělené, brzy usychají, lodyžní jsou střídavé, peřenosečné s čárkovitými úkrojky. Kvete růžovofialovými květy ve úboru o průměru 0,9 - 1,6cm. Plodem je nažka délky 3,5 - 4,5mm s červenohnědým chmýrem.

Vyhovují ji kamenité stráně, písčiny, okraje lesů, atp. na plném slunci.

<https://www.rostliny.net/>