

Fimbristylis umbellaris

synonyma: *Dichostylis torresiana*, *Fimbristylis efoliata*, *Fimbristylis globulosa*, *Fimbristylis globulosa* var. *torresiana*, *Fimbristylis globulosa* var. *vicaryi*, *Fimbristylis hypsocolea*, *Fimbristylis torresiana*, *F.* var. *vicaryi*, *Fimbristylis utilis*, *Iria globulosa*, *Isolepis globulosa*, *Scirpus globulosus*, *Scirpus umbellaris*, *Trichelostylis globulosa*

čeleď: Cyperaceae

oblasti: J Čína, Japonsko, Malesie, Pákistán, Srí Lanka, Tichý oceán

Roste od Srí Lanky a Pakistánu po Čínu, Japonsko, Malesii a také v tichomoří jako trvalka. Dorůstá výšky 0,2 - 0,5 (i 1,2)m. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Sotnek má průměr 1 - 5mm. Lodyžní listy jsou zakrnělé, široké 1,5mm a mají uťatou pochvu. Květenství je dlouhé do 10cm, tvoří jej až 40 klásků, ty jsou kulaté nebo vejčité, dlouhé 4 - 8mm a široké 3 - 4mm. Plody jsou 3hranné, dlouhé 0,7 - 1mm a široké 0,6 - 0,8mm.

<https://www.rostliny.net/>