

Utricularia australis (Bublinatka jižní)

synonyma: U. f. tenuicaulis, Utricularia incerta, Utricularia jankae, Utricularia japonica, Utricularia mairii, Utricularia mutata, Utricularia neglecta, Utricularia pollichii, Utricularia protrusa, Utricularia sacciformis, Utricularia siakuiensis, Utricularia spectabilis, Utricularia tenuicaulis, Utricularia vulgaris f. tenuicaulis, Utricularia vulgaris f. tenuis, Utricularia vulgaris var. japonica, Utricularia vulgaris var. mutata, Utricularia vulgaris var. neglecta, Utricularia vulgaris var. tenuicaulis

čeleď: Lentibulariaceae

oblasti: Andalusie, Anglie, Austrálie, Česká republika, Írán, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Katalánsko, Makedonie, Německo, Polsko, S Afrika, S Indie, Skandinávie, Švýcarsko

Roste v Evropě. Místo kořenů vytváří prýty. Dorůstá délky (0,15 -) 0,2 - 0,4 (i 1,5)m. Listy jsou střídavé, dlouhé 2 - 4cm, zpeřené, konce úkrojků zpravidla až zašpičatělé, 1. měchýřek na 3 nejspodnějších úkrojcích má délku 2 - 3 (i 3,5)mm se stopkou délky (0,4 -) 0,5 - 1,2mm, velikost ostatních se jen málo liší. Kvete žlutými květy v hroznu o počtu (4 -) 8 - 10 (i 75) s průměrem 0,5 - 2mm, stopka má délku 1 - 3cm, je 3 - 5x delší než-li daný listen, po odkvětu se až 2x prodlužuje, koruna má velikost 1,3 - 1,9cm, dolní pysk na bocích plochý až zvlněný a ostruha má délku 5 - 6mm. Plody jsou zakrnělé, sterilní bez semen velikosti 3 - 4mm. Patří mezi chráněné rostliny C4.

Vyhovují ji mělké stojaté vody bohaté na živiny, zatopené jámy, mrtvá ramena, atp.

Množí se vegetativně díky turionům.

<https://www.rostliny.net/>