

Cotyledon woodii

synonyma: *Adromischus schaeferianus*, *Cotyledon buchholziana*, *Cotyledon leucothrix*, *Cotyledon ramosissima*, *Cotyledon reticulata*, *Cotyledon salmiana*, *Cotyledon ventricosa* var. *alpina*

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky do 1,2m. Listy jsou vstřícné, obkopinaté až obvejčité, špičaté, voskovité, dlouhé (2 -) 2,3 - 2,7 (i 3,2)cm, šířky 0,6 - 1,2 (i 1,5)cm. Květenství je 1 (i 2 - 3)četné, má (0,5 -) 1 - 3 (i 5)cm stopku, kališní laloky jsou 3úhlé, špičaté, dlouhé 3,5 - 4,5 (i 6)mm, koruna je červená až oranžová, trubka téměř válcovitá, dlouhá 1,2 - 1,5cm, laloky jsou kopinaté až vejčité a zpravidla stočené. Plody jsou podlouhlé, žluté, dlouhé 0,6 - 0,8mm a široké 1,8 - 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cremnophila*
- subsp. *woodii*

<https://www.rostliny.net/>