

## Ficus sycomorus (Fíkovník egyptský)

synonyma: *Ficus chanas*, *Ficus cocculifolia*, *Ficus cocculifolia* subsp. *sakalavarum*, *Ficus cocculifolia* var. *sakalavarum*, *Ficus comorensis*, *Ficus damarensis*, *Ficus gnaphalocarpa*, *Ficus integrifolia*, *Ficus mucoso*, *Ficus sakalavarum*, *Ficus scabra*, *F.* subsp. *gnaphalocarpa*, *F.* var. *alnea*, *F.* var. *polybotrya*, *F.* var. *prodigiosa*, *Ficus trachyphylla*, *Sycomorus antiquorum*, *Sycomorus gnaphalocarpa*, *Sycomorus gnaphalocarpus*, *Sycomorus rigida*, *Sycomorus trachyphylla*, *Sycomorus trachyphyllus*

čeleď: Moraceae

oblasti: Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická Republika Kongo (Zair), Džibútí, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jemen, Jižní Súdán, Keňa, KwaZulu-Natal, Libanon, Madagaskar, Makarónésie, Malá Asie (Anatolie), Malawi, Mali, Mauretánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Omán, Palestina, Pobřeží Slonoviny, Republika Kongo, Rwanda, Saudská Arábie, Senegal, Somálsko, Středoafriická Republika, Středozeemí, Súdán, Svazijsko, Sýrie, Tanzánie, Togo, Transvaal, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste ve střeozemí, Blízkého Východu, Madagaskaru a východní, střední a jižní Africe v podobě stromu se širokou korunou a krátkým tlustým kmenem se štíhlými opěrnými kořeny. Dorůstá výšky 8 - 20m. Borka je žlutě hnědá a odlupuje se v deskách. Větve jsou hnědé, holé a na povrchu mají velké lenticely. Palisty jsou dlouhé 0,5 - 2,5cm. Listy jsou široce vejčité až okrouhlé, mírně kožovité, tmavě zelené, lesklé, zvlněné, na okraji mírně drsné, dlouhé 10 - 20 (i 21)cm, báze srdčitá, spodní strana světlejší, jemně ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 10 párů žilek a stopky jsou hnědé, mírně ochlupené a dlouhé 0,9 - 6cm. Plody jsou bohaté, bíle ochlupené, žluté až načervenalé a široké 1,4 - 3,7 (i 5)cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *gnaphalocarpa*/*F.* *gnaphalocarpa*/*F.* *trachyphylla*/*Sycomorus gnaphalocarpa*/*Sycomorus trachyphylla* - plody samostatné nebo párovité, objevují se v paždí listů mladých větví
- subsp. *sycomorus*/*F.* *chanas*/*Sycomorus antiquorum*/*Sycomorus rigida* - plody svazčité, na bezlistých větvích se objevují přímé na kmeni

<https://www.rostliny.net/>