

Zygophyllum fabago (Kaciba bobovitá)

synonyma: Fabago alata, Fabago major, Z. subsp. dolichocarpum, Z. subsp. orientale

čeleď: Cactaceae

oblasti: Afrika, Andalusie, Idaho, Írán, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kolorado, Montana, Nevada, New York, Nové Mexiko, Pennsylvania, Texas, V Středozeří, Washington

Roste ve východním středozemí, Blízkém Východě a Africe v podobě trvalky. Dorůstá délky 0,3 - 1cm. Stonky jsou dlouhé, sukulentní a hranaté. Listy jsou vstřícné, 2četné, vlastní lístky jsou voskovité, eliptické až obvejčité, hrotité, asymetrické, dužnaté a dlouhé (1,5 -) 2 - 2,5 (i 3)cm. Květy jsou párovité, malé, 5tičetné, dlouze stopkaté, průměru 1,5 - 2cm, kališní lístky podlouhlé až obvejčité, bíle lemované, dlouhé 4 - 8mm a korunní lístky jsou obvejčité, nehetnaté, asymetricky vykrajované, ve spodní 1/2 oranžové, ve zbytku bílé a dlouhé 0,5 - 1,1cm. Plodem je 5tikomorová obvejčitá válcovitá mírně hranatá převislá tobolka délky 1,7 - 3,5cm a obsahuje asymetrická hnědá semena délky 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. brachypterum
- subsp. dolichocarpum
- subsp. fabago
- subsp. orientale

<https://www.rostliny.net/>