

# Reaumuria cistoides

synonyma: *Reaumuria hypericoides*, *Reaumuria hypericoides* var. *angustifolia*, *Reaumuria hypericoides* var. *angustifolia* f. *panicu*, *Reaumuria hypericoides* var. *cistoides*, *Reaumuria hypericoides* var. *latifolia*, *Reaumuria hyrcanica*, *Reaumuria korovinii*, *Reaumuria linifolia*, *Reaumuria tatarica*

čeleď: Tamaricaceae

oblasti: Írán, Střední Asie

Roste ve střední Asii a Íránu v podobě polokeře. Dorůstá výšky až 50cm. Borka je hnědá nebo nažloutlá. Má mnoho vzpřímených větví. Listy jsou tlusté, ploché, kopinatě čárkovité až kopinatě šídlovité nebo eliptické, špičaté, čárkovitě kopinaté nebo čárkovité, dlouhé 0,5 - 1,5cm, široké 2 - 7mm. Kvetou pouze vzácně samostatnými květy, obvyklý je chocholičnatý hrozen délky 5 - 9cm a šířky 3 - 5cm. Listeny jsou čárkovitě kopinaté, dlouhé 5 - 8mm. Kalich je hluboce laločnatý, dlouhý 3 - 5mm. Okvětní lístky jsou červené až růžové, vejčité nebo podlouhlé, dlouhé 0,8 - 1,5cm a široké 2,5 - 4mm. Semeníky jsou zakulacené, dlouhé 3mm. Plodem je eliptická tobolka délky 6 - 8mm, šířky 3 - 4mm a obsahuje hnědá dlouze obvejčitá 4mm semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *angustifolia* - čárkovitě kopinaté až čárkovité listy délky 0,5 - 1,5cm a šířky 1 - 2mm
- var. *korovinii* - kopinatě lopatkovité listy délky 0,3 - 1cm a šířky 1 - 3mm

<https://www.rostliny.net/>