

Hugueninia (Huguenínie)

čeleď: Brassicaceae

Existuje pouze 1 druh. Rodové jméno bylo vybráno na počest savojského botanika žijícího v 19 století.

Hugueninia tanacetifolia (Huguenínie vratičolistá)

synonyma: *Descurainia tanacetifolia*, *Eruca tanacetifolia*, *Erysimum tanacetifolium*, *Hesperis tanacetifolia*, *H. tanacetifolia* subsp. *tanacetifolia*, *Phryne tanacetifolia*, *Sisymbrium tanacetifolium*

oblasti: Apeniny, Francie, JZ Alpy, Katalánsko, Pyreneje, Švýcarsko, Z Alpy

Pochází z hor Iberského poloostrova, Francie, Itálie, Švýcarska, Pyrenejí a jihozápadních Alp. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,2 - 1m. Stonek je pavučovitě chlupený, olistěný a větvený je až na konci. Dolní listy jsou řapíkaté, dlouhé do 30cm. Horní jsou přisedlé. Oba jsou peřenosečné s 4 - 10ti úzce kopinatými ostře zubatými zastříhovanými úkrojky. Kvete 4 - 7mm žlutými květy v bohaté chocholičnaté latě. Kališní lístky mají délku 2 - 3mm, okvětní lístky jsou dlouhé 4mm. Plodem je 0,8 - 1,5cm šešule. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *suffruticosa*
- subsp. *tanacetifolia* (Huguenínie vratičolistá pravá)

Vyhovují jí náplavy, okraje toků, sutě, vlhké výživnější půdy se silikátovým podkladem a vyšší nadmořská výška.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hugueninia-tanacetifolia/>

<https://www.rostliny.net/>