

Rhaponticum repens

synonyma: *Acroptilon angustifolium*, *Acroptilon australe*, *Acroptilon obtusifolium*, *Acroptilon picris*, *Acroptilon repens*, *Acroptilon serratum*, *Acroptilon subdentatum*, *Carduus picris*, *Centaurea picris*, *Centaurea repens*, *Serratula picris*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Jižní Dakota, JV Evropa, Kalifornie, Kansas, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Manitoba, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste v Euroasii jako trvalka a zavlečen byl do Severní Ameriky. Dorůstá výšky 15 - 70 (i 80)cm. Vytváří mnoho podzemních výběžků. Lodyha je řídce chocholičnatě větvená. Listy jsou pavučinovitě ochlupené, tuhé, šedozelené, čárkovité až podlouhlé, špičaté, přízemní zpravidla řídce zubaté (i peřenosečné), obkopynaté, zpeřeně laločnaté délky 3 - 8cm a šířky 2 - 3cm. Kvete růžovofialovými květy v úboru, zákrov je víceřadý, dlouhý 1 - 1,3cm, široký 5 - 8mm, vnější listeny kulatě vejčité s blanitými tupými ochlupenými přívěsky a vnitřní mají podlouhlé, dlouze ochlupené přívěsky, vlastní květy oboupohlavné, trubkovité, o 1/2 delší zákrovu. Plodem je nažka délky 2,5 - 4mm s opadavým chmýrem délky 0,8 - 1,1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. australe
- subsp. repens

<https://www.rostliny.net/>