

Serapias vomeracea (Serapie nachová)

synonyma: *Helleborine longipetala*, *Helleborine pseudocordigera*, *Lonchitis longipetala*, *Orchis vomeracea*, *Serapias cordigera* subsp. *vomeracea*, *Serapias cordigera* var. *longipetala*, *Serapias hirsuta*, *Serapias lancifera*, *Serapias longipetala*, *Serapias pseudocordigera*, *S. f. platyglottis*, *S. f. platypetala*, *S. f. stenopetala*, *S. subsp. flava*, *S. subsp. istriaca*, *S. subsp. longipetala*, *S. var. cordigeroides*, *S. var. longipetala*, *Serapiastrum longipetalum*, *Serapiastrum vomeraceum*

čeleď: Orchidaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Itálie, Izrael, Jordánsko, JZ Rusko, Katalánsko, Kavkaz, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makedonie, Maroko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Turecko

Roste v jižní Evropě a ve středozemí po Kavkaz jako trvalka. Dorůstá výšky 20 - 40 (i 60)cm. Pod zemí vytváří 2 kulovité hlízky. Má 2 bazální listy a (4 -) 6 - 8 lodyžních úzce kopinatého tvaru, délky 6 - 19cm, šířky 0,5 - 1,5cm a barvy zelené až červené. Kvete v řídkém klasu ze 3 - 10 (i 12)ti květů, podpůrné listeny jsou zvětšené, kápoité, eliptické, zašpičatělé, hnědofialové, žilnaté, vlastní květy jsou červenofialové až nahnědlé, přilba je složená ze 3 vnější a 2 vnitřních okvětních lístků, 3 vnitřní je 2dílný. Plodem je tobolka. Je zapsaný v seznamu CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *vomeracea*
- subsp. *longipetala*
- subsp. *laxiflora*

Vyhovují jí louky a světlé listnaté i jehličnaté lesy.

<https://www.rostliny.net/>