

Dysphania

čeleď: Chenopodiaceae

Roste v tropech a subtropích jako jednoletka nebo krátce žijící trvalka. Stonek je ochlupený. Listy jsou střídavé, většinou řapíkaté. Čepel bývá čárkovitá, kopinaté, obkopinatá, oválná nebo eliptická, často zpeřeně laločnatá či zubatá, často s uťatou bází. Kvete v terminálním květenství.

Dysphania ambrosioides

synonyma: *Ambrina ambrosioides*, *Ambrina ambrosioides* var. *anthelmintica*, *Ambrina anthelmintica*, *Ambrina incisa*, *Ambrina parvula*, *Ambrina spathulata*, *Atriplex ambrosioides*, *Atriplex anthelmintica*, *Blitum ambrosioides*, *Botrys ambrosioides*, *Botrys anthelmintica*, *Chenopodium album* subsp. *ambrosioides*, *Chenopodium amboanum*, *Chenopodium ambrosioides*, *Chenopodium ambrosioides* f. *angustifolium*, *Chenopodium ambrosioides* f. *dentatum*, *Chenopodium ambrosioides* f. *integrifolium*, *Chenopodium ambrosioides* f. *minus*, *Chenopodium ambrosioides* f. *pinnatifidum*, *Chenopodium ambrosioides* f. *rotundatum*, *Chenopodium ambrosioides* f. *spathulatum*, *Chenopodium ambrosioides* f. *suffruticosum*, *Chenopodium ambrosioides* subsp. *suffruticosum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *angustifolium*, *Chenopodium ambrosioides* var. *anthelminticum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *costei*, *Chenopodium ambrosioides* var. *dentatum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *genuinum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *integrifolium*, *Chenopodium ambrosioides* var. *oblanceolatum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *obovata*, *Chenopodium ambrosioides* var. *obovatum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *pinnatifidum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *pubescens*, *Chenopodium ambrosioides* var. *querciforme*, *Chenopodium ambrosioides* var. *suffruticosum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *typicum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *vagans*, *Chenopodium angustifolium*, *Chenopodium anthelminticum*, *Chenopodium anthelminticum* var. *glabratum*, *Chenopodium anthelminticum* var. *hastatum*, *Chenopodium anthelminticum* var. *subhirsutum*, *Chenopodium citriodorum*, *Chenopodium cuneifolium*, *Chenopodium integrifolium*, *Chenopodium integrifolium* subsp. *ramosissimum*, *Chenopodium opulifolium* subsp. *amboanum*, *Chenopodium querciforme*, *Chenopodium querciforme* var. *minus*, *Chenopodium sancta-maria*, *Chenopodium santamaria*, *Chenopodium spathulatum*, *Chenopodium spathulatum* var. *angustifolium*, *Chenopodium spathulatum* var. *platyphyllum*, *Chenopodium suffruticosum*, *Chenopodium suffruticosum* subsp. *remotum*, *Chenopodium vagans*, *Chenopodium variegatum*, *D. anthelmintica*, *Orthosporum ambrosioides*, *Orthosporum suffruticosum*, *Roubieva anthelmintica*, *Teloxys ambrosioides*, *Teloxys vagans*, *Vulvaria ambrosioides*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Evropa, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, J Mexiko, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste ve střední Americe, Jižní Americe, jižním Mexiku a teplém či subtropickém prostředí Evropy. Patří mezi jednoletky nebo krátce žijící trvalky. Dorůstá výšky 0,25 - 1,2m. Stonek je nepravidelně větvený. Listy mají podlouhlý až obkopinatý tvar délky do 12cm a krátké řapíky. Květ má velikost 1,5mm. Lze ji využít v potravinářství i léčitelství.

Dysphania aristata

synonyma: *Atriplex aristata*, *Chenopodium aristatum*, *Chenopodium aristatum* var. *inermis*, *Chenopodium minimum*, *Chenopodium secundiflorum*, *Chenopodium tibeticum*, *Chenopodium virginicum*, *Lecanocarpus aristatus*, *Teloxys aristata*

oblasti: Aljaška, Kyrgyzstán, Michigan, New York

Dysphania botrys

synonyma: *Ambrina botrys*, *Ambrina foetida*, *Atriplex botrys*, *Botrydium aromaticum*, *Botrydium botrys*, *Botrys aromatica*, *Chenopodium aromaticum*, *Chenopodium botrydium*, *Chenopodium botryoides*, *Chenopodium botrys*, *Chenopodium ilicifolium*, *Chenopodium multiflorum*, *Chenopodium nepalense*, *Neobotrydium botrys*, *Roubieva botrys*, *Teloxys botrys*, *Vulvaria botrys*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Gansu, Himálaj, Hindúkuš, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Maine, Maryland, Massachusetts, Mexiko, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Palestina, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Sichuan, Střední Evropa, Středozeří, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Xinjiang, Yunnan, Západní Virginie

Pochází ze středozeří a střední Asie, rozšířila se ale i jinde. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 5 - 40 (i 60)cm. Povrch je ochlupený. Stonky jsou vzpřímené, větvené zejména uprostřed, a větve jsou rozložité nebo vystoupavé. Listy jsou celkově podlouhlé nebo eliptické, s 2 - 5ti laloky, nažloutlé až hnědozelené, dlouhé 1 - 6cm. Květenství se objevuje na spodní straně listů, široké do 10cm. Plody mají v průměru 0,6 - 0,8mm a obsahují černá až červenočerná semena velikosti 0,6 - 0,8mm.

Dysphania carinata

synonyma: *Ambrina carinata*, *Ambrina carinata* var. *parvifolia*, *Blitum carinatum*, *Blitum glandulosum*, *Blitum glandulosum* var. *parvifolium*, *Chenopodium carinatum* f. *foliosum*, *Chenopodium carinatum* var. *holopterum*, *Chenopodium cristatum* f. *holopterum*, *Chenopodium cristatum* var. *holopterum*, *Chenopodium holopterum*

oblasti: Austrálie

Dysphania chilensis

synonyma: *Ambrina andicola*, *Ambrina chilensis*, *Ambrina denudata*, *Ambrina incisa*, *Chenopodium ambrosioides* f. *angustatum*, *Chenopodium ambrosioides* f. *denudatum*, *Chenopodium ambrosioides* subsp. *chilense*, *Chenopodium ambrosioides* var. *andicola*, *Chenopodium ambrosioides* var. *anthelminticum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *chilense*, *Chenopodium ambrosioides* var. *chilensis*, *Chenopodium ambrosioides* var. *denudatum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *euchilense*, *Chenopodium ambrosioides* var. *incisum*, *Chenopodium andicola*, *Chenopodium anthelminticum* var. *chilense*, *Chenopodium chilense*, *Chenopodium chilense* var. *angustifolium*, *Chenopodium chilense* var. *denudata*, *Chenopodium chilense* var. *incisa*, *Chenopodium sooiatum*

oblasti: Čile

Dysphania congolana

oblasti: Afrika

Dysphania cristata

synonyma: Blitum cristatum, Chenopodium cristatum

oblasti: Austrálie

Pochází z Austrálie.

Dysphania glandulosa

oblasti: Austrálie

Dysphania glomulifera

synonyma: Chenopodium myriocephalum, D. myriocephala

oblasti: Austrálie

Dysphania kalpari

oblasti: Austrálie

Dysphania littoralis

synonyma: Chenopodium blackianum

oblasti: Austrálie

Dysphania melanocarpa

synonyma: Chenopodium carinatum f. leucocarpum, Chenopodium carinatum var. melanocarpum, Chenopodium melanocarpum, Chenopodium melanocarpum f. leucocarpum, D. melanocarpa f. leucocarpa

oblasti: Austrálie

Pochází ze semiaridních oblastí Austrálie. Patří mezi jednoletky a aromatické rostliny. Stonek je ochlupený, plazivý a větvený od báze. Listy mají oválný tvar délky asi 1,5cm. Kvete v hustém klasu.

Dysphania multifida

synonyma: Chenopodium multifidum, Chenopodium multifidum f. spatulathum, Chenopodium multifidum f. typicum, Orthosporum multifidum, Roubieva multifida, Teloxys multifida

oblasti: Jižní Amerika

Pochází z Jižní Ameriky, ale stala se invazivní rostlinou na většině ostatních kontinentů. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky až 60cm. Stonek je větvený, vystoupavý. Listy jsou obvejčité, dlouhé do

2cm a na každé straně mají několik laloků. Kvete v paždí listů v kulovitém květenství o délce asi 5mm.

Dysphania plantaginella

synonyma: *Chenopodium plantaginellum*

oblasti: Austrálie

Dysphania platycarpa

oblasti: Austrálie

Dysphania pseudomultiflora

synonyma: *Chenopodium foetidum* subsp. *pseudomultiflorum*

oblasti: J Afrika

Dysphania pumilio

synonyma: *Ambrina pumilio*, *Blitum pumilio*, *Chenopodium carinatum* f. *rubellum*, *Chenopodium glandulosum*, *Chenopodium pumilio*, *Chenopodium pumilio* f. *glandulosum*, *Chenopodium pumilio* f. *rubellum*, *Teloxys pumilio*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Evropa, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Washington, Wisconsin

Pochází z Austrálie, ale zavlečen byl i jinde. Patří mezi jednoletky a aromatické rostliny. Dorůstá výšky kolem 25cm. Stonek je vzpřímený. Listy jsou střídavé, dlouhé do 2cm, mají kopinatý až oválný tvar s laločnatým okrajem. Povrch je bíle ochlupený. Kvete ve kulatém květenství.

Vyskytuje se podél silnic.

Dysphania pusilla

Dysphania rhadinostachya

synonyma: *Chenopodium rhadinostachyum*

oblasti: Austrálie

Dysphania saxatilis

synonyma: *Chenopodium saxatile*

Dysphania schraderiana

synonyma: *Chenopodium foetidum* subsp. *tibetanum*, *Chenopodium schraderianum*, *Teloxys foetida*, *Teloxys schraderiana*

Dysphania simulans

synonyma: *Chenopodium osbornianum*

oblasti: Austrálie

Dysphania sphaerosperma

oblasti: Austrálie

Dysphania truncata

synonyma: *Chenopodium truncatum*

Dysphania valida

oblasti: Austrálie

<https://www.rostliny.net/>