

Sarcostemma viminale

synonyma: Apocynum viminale, Euphorbia viminalis, Sarcostemma aphyllum, Sarcostemma tetrapterum, Vincetoxicum sarcostemmoides

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Austrálie, Čína, Etiopie, Ghana, Jemen, Jihoafrická Republika (JAR), Madagaskar, Malajsie, Melanésie, Omán, Saudská Arábie

Roste v Africe (Ghana až Etiopie a JAR) s přesahem na ostrovy Indického oceánu (Komory, Madagaskar, Réunion, Mauritius, Seychely), na Arabský poloostrov (Jemen, Saudská Arábie a Omán), Austrálii, Čínu, Malajsi a Melanésii. v podobě sukulentní dřevnaté liány. Dorůstá délky až 5m. Stonek je válcovitý, článkovitý, tlustý cca 6mm, má zelenou barvu a při poranění roní bílé mléko. Listy jsou zakrnělé a opadavé. Kvete na 0,4 - 1 (i 3)cm stopkách 5tičetnými vonnými béžovými nebo béžovozelenavými květy v hroznovitém vrcholíku. Mají délku 2,5 - 3mm a průměr 0,9 - 1cm. Kalich je drobný, korunní lístky jsou kopinaté až vejčité, dlouhé 4 - 8mm a při bázi jsou srostlé. Plodolisty jsou 2 a nejsou zcela srostlé. Plodem je párovitý 5 - 8cm dlouhý vřetenovitý měchýřek obsahující ochmýřená semena. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. brunonianum - Západní a severní Austrálie, Nový Jižní Wales, Malajsie, Čína, Indie, Melanésie a Afrika; dřevnaté liány; kmínky zelené až šedé; květy šířky 2 - 4mm.

Vyhovují mu suché savany, poloopadavé lesy, okraje lesů, skalnatá místa, atp. Slunce má ráda plné a teploty v rozmezí 23 - 27°C.

<https://www.rostliny.net/>