

# Turritis glabra

synonyma: *Arabis crepidiopoda*, *Arabis excelsa*, *Arabis glabra*, *Arabis glabra* subsp. *pseudoturritis*, *Arabis glabra* var. *furcatipilis*, *Arabis macrocarpa*, *Arabis perfoliata*, *Arabis pseudoturritis*, *Arabis turritis*, *Crucifera turritis*, *Erysimum glabrum*, *Erysimum glastifolium*, *Turritis dregeana*, *T. var. lilacina*, *Turritis macrocarpa*, *Turritis pseudoturritis*, *Turritis stricta*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Afrika, Alberta, Aljaška, Anglie, Arizona, Arkansas, Austrálie, Balkánský poloostrov, Britská Kolumbie, Connecticut, Černé moře, Česká republika, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Jižní Dakota, JV Asie, Kalifornie, Kansas, Kavkaz, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Skandinávie, Španělsko, Švýcarsko, Čína, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v Evropě, Asii a severní Africe. Patří mezi dvouletky. Dorůstá výšky 0,5 - 1,1 (i 1,4)m. Barva rostliny je šedozelená. Stonek není větvený. Přízemní listy jsou obkopinaté modře ojíněné (při květu již zaschlé), výše položené kopinaté se střelovitou objímavou bází zdvižené vzhůru. Kvete běžovými nebo nažloutlými květy v hroznu po 25ks. Plodem je šešule. Semena jsou svrasklá. Dříve byla používána jako léčivka.

Vyhovují mu chudé písčité propustné půdy, okraje lesů, kapenité i vápenité půdy a teplá místa.

<https://www.rostliny.net/>