

Willemetia stipitata (Pleška stopkatá)

synonyma: *Barkhausia apargioides*, *Calycocorsus hieracioides*, *Calycocorsus stipitatus*, *Chondrilla peltidium*, *Chondrilla stipitata*, *Crepis apargia*, *Crepis apargioides*, *Hieracium stipitatum*, *Willemetia apargioides*, *Willemetia hieracioides*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Albánie, Alpy, Česká republika, Itálie, Jugoslávie, Katalánsko, Makedonie, Německo, Pyreneje, S Řecko, Švýcarsko

Roste v Pyrenejích, Alpách s přesahem k nám. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 50 (i 80)cm. Pod zemí vytváří šikmý nebo vodorovný oddenek. Lodyha je řídce větvená, přímá, drutá, mělce rýhovaná, při zemi holá, pod květenstvím hustě ochlupená s černými žláznatými chloupky a bílými kratšími nežláznatými. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou řídce široce zoubkaté, obvejčité, sivozelené, holé, dlouhé 3 - 8cm a široké 1 - 2cm. Květenství tvoří lata z (1 -) 2 - 3 (i 5)ti žlutých úborů, zákrovní listeny jsou 2řadé, šídlovitě kopinaté, dlouhé 0,8 - 1,2cm, široké 1,5 - 2mm, tupě špičaté, zakončené dlouhými žláznatými chlupy a koruna je žlutá. Plodem je kuželovitá 3,5 - 4mm žlutohnědá nažka s bílým drsným chmýrem, náhle zúžená v zobánek délky 5 - 7mm. Patří mezi ohrožené druhy C3. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *albanica* - Albánie, Makedonie, severní Řecko

<https://www.rostliny.net/>