

Guizotia abyssinica (Mastňák habešský)

synonyma: *Anthemis mysorensis*, *Bidens ramtilla*, *G. var. angustior*, *G. var. baldratiana*, *G. var. candussoiana*, *G. var. caulirufa*, *G. var. corgevinii*, *G. var. negriana*, *G. var. pichisermollii*, *G. var. sativa*, *G. var. sciarapovii*, *Guizotia oleifera*, *Guizotia oleifera* subsp. *angustior*, *Guizotia oleifera* subsp. *sativa*, *Guizotia oleifera* var. *sativa*, *Jaegeria abyssinica*, *Polymnia abyssinica*, *Ramtilla oleifera*, *Ramtilla oleifera* var. *sativa*, *Tetragonotheca abyssinica*, *Verbesina sativa*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Connecticut, Etiopie, Illinois, Indie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Německo, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Střední Asie, Tennessee, Virginie, Wisconsin

Pochází z Etiopie ale rozšířil se široce po světě. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (0,4 -) 0,6 - 1 (i 2)m. Lodyha je přímá, tuhá, načervenalá, v mládí žláznatě ochlupená, hustě olistěná a v horní části vrcholičnatě větvená. Listy jsou úzce podlouhlé až široce kopinaté, přízemní vstříčné, horní střídavé, přisedlé až poloobjímavé, široce kopinaté, dlouhé do 20cm a řídce žláznatě pilovité. Kvete v úboru o průměru (2 -) 3 - 4 (i 5)cm, zákrov je jednořadý, tvoří jej 5 bylinných listenů, okvětní lístky jsou žluté, stejně jako v terči a spodní strana koruny má věneček chmýří. Plodem je 4boká hnědočerná až černá lesklá nažka délky 3,5 - 5mm. Lze je použít jako zdroj oleje.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>