

Corydalis stricta

synonyma: *Capnoides stricta*, *Corydalis astragalina*, *C. var. potaninii*

čeleď: Fumariaceae

oblasti: Kašmír, Pákistán, Pamír, Xizang (Tibet)

Roste v Pamíru, Tibetu a Kašmíru jako trvalka. Dorůstá výšky (15 -) 25 - 50 (i 60)cm. Stonek může být řídce větvený. Přizemní listy jsou bohaté, 2 - 3x lichozpeřené, tvořené 3 - 5ti páry lístků, dlouhé 7 - 15cm, široké (1,5 -) 2 - 4cm, řapíky mají délku čepele, lístky mohou být řapíčkaté, dlouhé 1,5 - 3cm, široké 1 - 1,5cm, jsou znovu 3 - 4laločné, laloky znovu laločnaté, vejčité, 3úhlé nebo úzce podlouhlé, špičaté, dlouhé (1 -) 3 - 6 (i 8)mm, široké 1 - 3mm, lodyžní listy jsou střídavé, podobné, ale s výškou se zmenšující a přisedlé. Květenstvím je vrcholový 20 - 30tkvětý hrozen délky 3 - 5cm, šířky 2 - 4cm, listeny jsou dlouhé a vejčité až kopinaté. Plodem je čárkovitá tobolka délky 2 - 3cm, šířky 2,5 - 3,5mm a obsahuje černá semena průměru 2mm.

<https://www.rostliny.net/>