

Bulbine frutescens

synonyma: *Anthericum frutescens*, *Anthericum fruticosum*, *Anthericum incurvum*, *Anthericum multiceps*, *Anthericum rostratum*, *Bulbine caulescens*, *B. var. incurva*, *B. var. rostrata*, *Bulbine incurva*, *Bulbine rostrata*, *Phalangium frutescens*, *Phalangium rostratum*

čeleď: Xanthorrhoeaceae

oblasti: Kapsko, Limpopo, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku jako trvalka. Dorůstá výšky 30 - 45 (i 60)cm a ještě větší šířky. Stonek je od báze větvený, vystoupavý nebo přímý, může jich být více, jsou šedozelené až světlezelené a zakončené hroznovitým květenstvím. Listy jsou vstřícné, seskupené na bázi, ztlustlé, duté, čárkovité, světlezelené až šedozelené, vzpřímené, na slunci voskovité a dlouhé 4 - 15 (i 22)cm. Květenství je vzpřímené až vystoupavé, hroznovité, dlouhé do 45cm, vlastní květy jsou malé, žluté až oranžové, 6tičetné, vodorovné až mírně převíslé s oranžovým proužkem na korunních lístcích. Plodem je malá kulatá 3pouzdrá tobolka obsahující vejčitá černá semena. Má léčivé účinky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Hallmark' - květy ploché a žluté

Vyhovují ji křoviny. Zálivka se provádí až po proschnutí substrátu. Ten by měl mít hlinitopísčité složení s dobrou drenáží. Zimuje v rozmezí 5 - 8°C při omezené zálivce (odolává teplotám až do -5°C).

Množí se řízkem.

<https://www.rostliny.net/>