

Braya rosea

synonyma: *Braya aenea*, *Braya aenea* subsp. *pseudoaenea*, *Braya angustifolia*, *Braya brachycarpa*, *Braya brevicaulis*, *Braya limosella*, *Braya limoselloides*, *B. var. aenea*, *B. var. angustifolia*, *B. var. brachycarpa*, *B. var. glabra*, *B. var. glabrata*, *B. var. leiocarpa*, *B. var. multicaulis*, *B. var. simplicior*, *Braya sinuata*, *Braya thomsonii*, *Braya tibetica*, *Braya tibetica* f. *breviscapa*, *Braya tibetica* f. *linearifolia*, *Braya tibetica* f. *sinuata*, *Braya tinkleri*, *Braya trinkleri*, *Draba rosea*, *Hesperis limosella*, *Hesperis limoselloides*, *Hesperis rosea*, *Platypetalum roseum*, *Sisymbrium alpinum* var. *aeneum*, *Sisymbrium alpinum* var. *roseum*, *Sisymbrium limosella*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Kašmír, Pákistán, Xizang (Tibet)

Roste ve střední Asii jako trvalka. Dorůstá výšky (2 -) 5 - 8 (i 12)cm. Stonek je vzpřímený až vystoupavý a řídce ochlupený. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou řapíkaté, čárkovité až obvejčité, mohou být zubaté, dlouhé 1,5 - 4cm a široké 2 - 5mm. Květenstvím je 10 - 20tkvětý hrozen, vlastní květy mají průměr 2,5mm, až 4mm stopku, jsou růžové, růžovořialové nebo bílé, kališní lístky mohou být na konci nafialovělé, dlouhé 2 - 2,5mm, korunní lístky jsou kopist'ovité nebo obvejčité, dlouhé 3 - 3,5 (i 4)mm a široké 1mm. Plody jsou eliptické až podlouhlé, dlouhé 4 - 6 (i 7)mm, široké (1 -) 1,5 (i 2)mm a obsahují 8 - 14 žlutohnědých semen délky 1mm.

Vyhovuje jim vlhká úrodná půda, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

<https://www.rostliny.net/>