

# Carpobrotus edulis (Kosmatcovník jedlý)

synonyma: *Abryanthemum edule*, *Carpobrotus edulis*, *C. var. chrysophthalmus*, *Carprobrotus acinaciformis*, *Mesembryanthemum edule*, *Mesembryanthemum acinaciforme*

čeleď: Aizoaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Argentina, Chorvatsko, Florida, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Austrálie, Jordánsko, Kalifornie, Kapsko, Katalánsko, Korsika, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Nový Jižní Wales, Nový Zéland, Queensland, Sardínie, Střední střeozemí, Sýrie, Tasmánie, Tunisko, Uruguay, Velká Británie, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v JAR v podobě sukulentní plazivé trvalky. Lodyha dorůstá délky 0,6 - 2 (i 3)m a v uzlinách znovu zakořeňuje. Listy jsou vstřícné, vzpřímené, 3úhlé, prohnuté, drobně pilovité, načervenalé, dlouhé 5 - 11cm a široké 1 - 1,5cm. Kvete samostatnými světležlutými (později růžovými) květy o průměru 6 - 8 (i 10)cm, korunní lístky jsou dlouhé 3 - 4cm. Plodem je nahnědlá jedlá dužnatá tobolka obsahující až 1000 semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *edulis* (Kosmatcovník jedlý pravý)
- subsp. *parviflorus*
- var. *rubescens* - Irsko

Vyhovují mu pobřežní písčiny, duny, útesy, okraje cest, atp. Přebývá při teplotách 5 - 10°C a za sucha.

<https://www.rostliny.net/>