

Cotoneaster praecox (Skalník raný)

synonyma: Cotoneaster adpressus 'Praecox', Cotoneaster adpressus var. praecox, Cotoneaster nanchuanicus, Cotoneaster NanShan

čeleď: Rosaceae

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě opadavého široce rozkladitého až poléhavého i plazivého keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Větve vyrůstají do šířky, odstávají obvykle 2řadě. Jejich barva je hnědá až načervenalá. Listy jsou na sterilních větvích téměř kulaté až mírně vejčité či eliptické, na konci hrodité až špičaté, báze tupá, okraj nápadně zvlněný, horní strana je matná tmavězelená, v mládí řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek, má 2 - 3mm řapíky, délku 1 - 2,5cm a šířku 0,8 - 2,4cm. Na fertilních výhonech je 4 - 5 listů o velikosti 1 - 2cm. Kvete po 1 - 4 na max. 1mm stopkách. S češulí mají délku 0,7 - 1cm. Češule je široce pohárkovitá, načervenalá. Plody jsou téměř kulovité, mají velikost 0,8 - 1,2cm a mají sytě červenou jásavou barvu. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Boer' - poléhavý s vystoupavými větvemi na jejich koncích
- 'Nan Shan'

<https://www.rostliny.net/>