

Holodiscus discolor (Celoterčník různobarvý)

synonyma: *Schizonotus argenteus* var. *ariifolius*, *Schizonotus argenteus* var. *discolor*, *Schizonotus ariifolius*, *Schizonotus discolor*, *Schizonotus discolor* var. *purshianus*, *Sericotheca discolor*, *Spiraea ariifolia*, *Spiraea ariifolia* var. *discolor*, *Spiraea discolor*, *Spiraea discolor* var. *ariifolia*, *Thecanisia discolor*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Mexiko, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wyoming

Roste na západě Severní Ameriky v podobě od báze větveného keře. Dorůstá výšky (1 -) 1,5 - 3 (i 6)m a méně větší šířky. Dřevo je velmi tvrdé. Větve jsou silné, hnědočervené, v mládí tenké a převislé. Listy jsou vejčité až dlouze eliptické, na konci tupé, mělce peřenolaločné s vroubkovanými laloky na konci, mírně svrasklé, lesklé, dlouhé 1,5 - 7 (i 8)cm, báze je celokrajná, spodní strana může být až bíle plstnatá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je převislá lata délky 8 - 17 (i 30)cm, šířky 5 - 15cm, vlastní květy jsou béžovo bílé, 5tičetné, průměru 4mm a korunní lístky jsou dlouhé 1,5 - 2mm. Plodem je světlehnědý ochlupený měchýřek délky 2mm a obsahuje 1 semeno. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *ariaefolius*/var. *ariifolius* - hlouběji vykrojené listy, spodní strana šedozeleně ochlupená
- 'Carneus' - hlouběji vykrojené listy; jemně růžové květy
- var. *dumosus*/H. *dumosus*/*Spiraea discolor* - Utah až Nové Mexiko; nízký až poléhavý habitus; výška 0,3 - 0,7 (i 1,5)m; větve vzpřímené; listy téměř přisedlé, obvejčité, horní strana měkce ochlupená, spodní bíle plstnatá, celková délka 2 - 4cm; květy žlutobílé seskupené do úzkých až 20cm dlouhých vzpřímených až převislých latách, kališní lístky délky 1,2 - 2mm, okvětní lístky 2,7 - 3,5mm

Vyhovují mu suché až vlhké dobře propustné půda se středním obsahem živin na plném slunci nebo polostínu. Každý 2. rok se vyřezávají starší větve.

<https://www.rostliny.net/>