

Cotoneaster schubertii

čeleď: Rosaceae

oblasti: Kašmír, Pákistán

Roste v Kašmíru a Pákistánu v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou vzpřímené, rozkladité, v mládí šedohnědé, s lenticelami, v mládí hustě ochlupené. Listy jsou téměř kožovité, na sterilních větvích téměř zaokrouhlené, široce eliptické nebo široce obvejčité, na konci zakulacené, špičaté, uťaté nebo vykrojené, báze klínovitá nebo tupá, horní strana bývá mírně svrasklá, šedozelená nebo zelená, mírně lesklá, olysává, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů mírně zapuštěných žilek, spodní strana je šedozelená, hustě ochlupená, řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm, celková délka je 2,9 - 4,8cm a šířka 2,7 - 3,9cm. Květenství je 7 - 15tičetné. Květy mají 1 - 7mm stopky, pohárkovitou češuli, kališní lístky tupé, špičaté, poupata bílá, koruna velikosti 1 - 1,2cm, okvětní lístky rozložené. Plody jsou zploštěle kulovité nebo obvejčité, červené, huňaté, velké 8 - 9mm.

<https://www.rostliny.net/>