

# Acer ukurunduense

synonyma: *Acer caudatum* subsp. *ukurunduense*, *Acer caudatum* var. *ukurunduense*, *Acer dedyle*, *Acer lasiocarpum*, *Acer spicatum* sensu, *Acer spicatum* subsp. *ukurunduense*, *Acer spicatum* var. *ukurunduense*, *Acer spicatum* var. *ussuriense*, *A. var. pilosum*, *A. var. sachalinense*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Čína, Japonsko, Korea, V Rusko

Roste v Číně, Japonsku, Koreji a východním Rusku v podobě menšího řidčeji větveného stromu nebo keře s větvením až k zemi. Habitus je široce vejčitý. Dorůstá výšky 3 - 14m. Mladé větve jsou oranžovošedé až červené, později šedožluté, pupeny jsou zašpičatělé, po stranách zploštělé, se 2mi velkými vnějšími šupinami a 2mi vnitřními šupinami. Listy jsou 5 - 7milalochné, dlouhé 10 - 14cm, široké 7 - 11cm, tvar je okrouhlevejčitý, báze srdčitá, spodní strana hustě plstnatá, laloky jsou hluboké a úzce až široce vejčité, nápadně pilovité, řapíky jsou dlouhé 5 - 8cm. Květenství je zelenobílé, husté a široké, hroznovité, dlouhé až 15cm, 120tičetné, vzpřímené, květy drobné, kališní lístky oválně kopinaté, dlouze ochlupené, okvětní lístky jsou 2 - 3x delší než kališní, je jich 5ks, jsou čárkovitě lopatkovité, holé, stopky květů mají délku 5 - 8mm a tyčinek je 8. Křídla 2nažek svírají ostrý úhel a mají délku 1,5 - 4cm.

<https://www.rostliny.net/>