

## Acer laxiflorum (Javor řídkokvětý)

synonyma: *Acer pectinatum* subsp. *laxiflorum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Pochází z Číny a řadí se do skupiny tzv. pyžamových javorů s pruhovanou borkou. Dorůstá výšky 6 - 15m. Mladé větve jsou načervenalé, holé. Borka je hladká, pruhovaná v barvách zelené, bílé nebo načervenalé. Listy jsou vejčité, mohou být mírně kožovité, 3 (i 5)laločné, postranní laloky jsou nenápadné, centrální je prodloužený, špičatý, nepravidelně jemně pilovitý, horní strana je tmavězelená, spodní bledší, řapíky jsou načervenalé, dlouhé 3 - 6cm, celková délka je 6 - 14cm, šířka 5 - 8cm. Květy jsou hnědozelené, seskupené do 10cm převislých hroznů. Kališních lístků je 5, okvětních také 5, jsou žlutozelené a obvejčité. Nažky jsou hnědožluté, semena mají pouzdra o průměru 8mm, délku 2,5 - 3cm, šířku 1cm, křídla svírají pravý až přímý úhel. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *integrifolium* - téměř celokrajné listy
- var. *longiphyllum* - délka listů 20cm, ochlupená žilnatina

<https://www.rostliny.net/>