

Lespedeza

čeleď: Fabaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest španělského guvernéra jménem Céspedes, bohužel s překlepem. Roste v teplých a subtropických oblastech východu Severní Ameriky, východní a jižní Asie a Austroasie v podobě jednoletky, trvalky, polokeře nebo opadavého keře. Vytváří dlouhé větve. Listy jsou 3četné. Kvete na jednoletém dřevě v hroznu nebo chudé hlávce a vlastní květy jsou drobné. Plodem je lusk obsahující 1 semeno.

Vyhovuje jí plné slunce a dobře propustná půda. Před zimou se krček rostliny schovává pod nahnutou hlínu - je totiž citlivá na mráz.

Množí se řízkami, semeny nebo dělením.

Lespedeza acuticarpa

Lespedeza alata

Lespedeza angustifolia

synonyma: *Despeleza angustifolia*, *L. angustifolia* f. *angustifolia*, *L. angustifolia* f. *subvelutina*, *L. angustifolia* var. *brevifolia*, *L. capitata* var. *angustifolia*, *L. hirta* var. *angustifolia*, *L. hirta* var. *intercursa*

oblasti: Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Virginie

Lespedeza bicolor (Lespedézie dvoubarvá)

synonyma: *Desmodium penduliflorum*, *L. bicolor* f. *alba*, *L. bicolor* f. *grandifolia*, *L. bicolor* f. *pendula*, *L. bicolor* f. *rosea*, *L. bicolor* var. *alba*, *L. bicolor* var. *bicolor*, *L. bicolor* var. *intermedia*, *L. bicolor* var. *japonica*, *L. bicolor* var. *nana*, *L. bicolor* var. *sericea*, *L. ionocalyx*, *L. penduliflora*, *L. setiloba*, *L. spicata*, *L. tobae*, *L. veitchii*

oblasti: Alabama, Anhui, Arkansas, Connecticut, Dálněvýchodní federální okruh, Delaware, Florida, Fujian, Gansu, Georgia, Guangdong, Guangxi, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hunan, Illinois, Indiana, Iowa, Japonsko, Jiangsu, Jilin, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Korea, Liaoning, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Sachalin, Severní Karolína, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Tennessee, Texas, Virginie, Vnitřní Mongolsko, Západní Virginie, Zhejiang

Roste v Japonsku, Koreji, Číně, Rusku, Sachalinu a Kurilských ostrovech v podobě vzpřímeného mnohokmenného keře a zavlečená byla do Severní Ameriky. Dorůstá výšky 1,5 (i 3)m. Větve jsou v mládí zelené, hranaté a ochlupené. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou eliptické až obvejčité, zakulacené nebo vykrojené, světlezelené, dlouhé 1,5 - 5cm, spodní strana je šedozelená a ochlupená. Květenstvím je hrozen seskupený v olistěné vrcholové latě s délkou 20 - 50cm, vlastní květy jsou tmavěružové až růzovofialové a dlouhé 1cm. Plodem je zploštělý nepukavý lusk délky 8mm obsahující 1 kulovité semeno. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. japonica

- 'Summer Beauty'

<div>Vyhovují ji dobře propustné středně úrodné půdy na plném slunci nebo v polostínu. Dobře snáší sucho i chudší půdy.</div>

Lespedeza brittonii

Lespedeza buergeri (Lespedézie Buergerova)

synonyma: L. bracteolata, L. buergeri var. kinashii, L. buergeri var. tetraloba, L. oldhamii

Lespedeza cambodianum

Lespedeza capitata

synonyma: Aeschynomene frutescens, Despeleza capitata, Hedysarum conglomeratum, Hedysarum frutescens, Hedysarum umbellatum, L. bicknellii, L. capitata f. argentea, L. capitata f. capitata, L. capitata var. capitata, L. capitata var. hirtiformis, L. capitata var. sericea, L. capitata var. stenophylla, L. capitata var. typica, L. capitata var. velutina, L. capitata var. vulgaris, L. frutescens, L. fruticosa, L. schindleri, L. velutina

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Lespedeza caraganae

Lespedeza chinensis

synonyma: L. canescens, L. chinensis var. nokoensis, L. formosensis, L. mucronata

oblasti: Čína

Lespedeza cuneata (Lespedézie klínovitá)

synonyma: Anthyllis cuneata, Aspalathus cuneata

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Lespedeza cyclobotrya

Lespedeza cyrtobotrya (Lespedézie obloukovitá)

synonyma: *L. anthobotrya*, *L. cyrtobotrya* f. *alba*, *L. cyrtobotrya* f. *semialba*, *L. cyrtobotrya* var. *kawachiana*, *L. cyrtobotrya* var. *longiramea*, *L. cyrtobotrya* var. *patens*, *L. cyrtobotrya* var. *pedunculata*, *L. kawachiana*

oblasti: Connecticut, Massachusetts, Virginie

Lespedeza cyrtobuergeri

Lespedeza daurica

synonyma: *Echinolobium trichocarpum*, *Hedysarum trichocarpum*, *L. daurica* subsp. *huangheensis*, *L. daurica* subsp. *potaninii*, *L. daurica* var. *beipiaoensis*, *L. daurica* var. *sinica*, *L. davurica* var. *potaninii*, *L. davurica* var. *prostrata*, *L. dielsiana*, *L. fauriei*, *L. feddeana*, *L. medicaginoides*, *L. potaninii*, *L. potaninii* f. *breviracemi*, *L. potaninii* var. *breviracemi*, *L. shimadai*, *L. trichocarpa*, *Trifolium dauricum*

oblasti: Delaware, Indiana, Ohio

Lespedeza davidii

synonyma: *L. hupehensis*, *L. merrillii*

Lespedeza davurica

synonyma: *L. dahurica*, *L. davurica* var. *davurica*, *L. trichocarpum*, *Trifolium dahuricum*, *Trifolium davuricum*

Lespedeza dunnii

synonyma: *L. metcalfii*

Lespedeza elegans

oblasti: Kašmír, Pákistán

Roste v Kašmíru a Pákistánu. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Stonek je vzpřímený. Palisty jsou dlouhé 5 - 7mm. Listy jsou zpeřeně 3četné, mají 0,8 - 2cm řapík, lístky jsou obvejčité až eliptické, zašpičatělé s hrotem, oboustranně ochlupené, dlouhé 1 - 2,6cm, široké 0,5 - 1,7cm a řapíčky jsou dlouhé 1mm. Květenstvím je přisedlý okolík nebo hrozen, listeny jsou ochlupené, ochlupené, dlouhé 1,5 - 2mm, vlastní květy mají 1mm stopku, kalich ochlupený, dlouhý 7 - 8mm, zuby dlouhé 4 - 4,5mm a pavéza je dlouhá 9mm. Plody jsou dlouhé 3 - 3,5mm a široké 0,3mm.

Lespedeza elliptica

Lespedeza fasciculiflora

synonyma: *L. floribunda* var. *fasciculiflora*, *L. monnoyeri*

Lespedeza flenryi

Lespedeza floribunda

synonyma: *L. floribunda* var. *alopecuroides*

oblasti: Gansu, Hebei, Jiangsu, Kašmír, Mongolsko, Pákistán, Shanxi, Sichuan, Yunnan

Roste v Pákistánu, Kašmíru, Číně a Mongolsku v podobě vzpřímeného větveného keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Povrch je ochlupený. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé 1,2 - 2,6cm, vlastní lístky jsou eliptické až obvejčité, uťaté s hrotem, oboustranně ochlupené, dlouhé do 2,5cm, široké do 1,8cm a řapíčky jsou dlouhé 5mm. Květenstvím je hrozen délky 2,5 - 3,8cm na 2,5 - 3mm stopce, listeny i listence jsou zakrnělé, vlastní květy mají kalich délky 5 - 5,5mm, zuby jsou delší trubky, koruna je světle růžově fialová a dlouhá 1cm. Plody jsou eliptické a dlouhé 6,5mm.

Lespedeza fordii

synonyma: *L. anhweiensis*, *L. paradoxa*

Lespedeza formosa

oblasti: Ohio, Tchaj-wan

Lespedeza forrestii

synonyma: *L. pampaninii*, *L. variegata* var. *cinerascens*

Lespedeza frutescens

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Lespedeza gerardiana

oblasti: Kašmír, Pákistán, Paňdžáb (indický), Sikkim, Uttarákhand, Xizang (Tibet)

Roste v Kašmíru, Pákistánu, Indii a Tibetu v podobě polokeře. Větve jsou ochlupené. Listy jsou 3četné, řapík dlouhý do 4mm, lístky jsou obkopinaté, čárkovité až úzce podlouhlé, uťaté s hrotem, dlouhé 0,7 - 2cm a řapíčky jsou dlouhé 2,5 - 3mm. Květenstvím je 4 - 8mikvětý okolík na max. 2,5cm stopce, listeny jsou dlouhé 4mm, vlastní květy mají kalich délky 7,5 - 9mm, zuby jsou delší trubky, koruna je světle žlutá, dlouhá 1,2 - 1,3cm a kýl je růžově fialově skvrnitý. Plody jsou ochlupené a dlouhé 2,5mm.

Lespedeza hengduanshanensis

synonyma: *L. fasciculiflora* var. *hengduanshanensis*

Lespedeza hiratukae

Lespedeza hirta

synonyma: *Despeleza hirta*, *Hedysarum hirtum*, *L. capitata* var. *calycina*, *L. hirta* subsp. *curtissii*, *L. hirta* subsp. *hirta*, *L. hirta* var. *calycina*, *L. hirta* var. *curtissii*, *L. hirta* var. *hirta*, *L. hirta* var. *sparsiflora*, *L. hirta* var. *typica*, *L. polystachya*, *Onobrychis hirta*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Lespedeza hisauchii

Lespedeza hispida

synonyma: *L. juncea* var. *hispida*, *L. sericea* f. *hispida*

Lespedeza homoloba

synonyma: *L. homoloba* var. *emarginata*, *L. homoloba* var. *longiloba*, *L. nikkoensis*, *L. retusa*, *L. rotundiloba*, *L. sendaica*

Lespedeza inschanica

synonyma: *L. cystoides* var. *inschanica*, *L. cytisoides* var. *inschanica*, *L. hedysaroides* var. *inschanica*, *L. inschanica* var. *flava*, *L. juncea* var. *inschanica*

Lespedeza intermedia

Lespedeza intermixta

synonyma: *L. juncea* var. *latifolia*, *L. juncea* var. *sericea*

Lespedeza japonica (Lespedézie japonská)

oblasti: Japonsko

Lespedeza jiangxiensis

Lespedeza juncea

synonyma: *Hallia juncea*, *Hedysarum junceum*, *L. cystoides*, *L. hedysaroides*, *L. hedysaroides* var. *subsericea*, *L. juncea* var. *subsericea*, *L. juncea* f. *umbrosa*, *L. juncea* var. *subsericea*, *Onobrychis juncea*, *Trifolium hedysaroides*

oblasti: Pákistán

Lespedeza kagoshimensis

synonyma: L. argyrophylla

Lespedeza kuisiana

Lespedeza leptostachya

synonyma: Despeleza leptostachya

oblasti: Illinois, Iowa, Minnesota, Wisconsin

Lespedeza lichiyuniae

Lespedeza longifolia

Lespedeza macrovirgata

Lespedeza manniana

Lespedeza maximowiczii (Lespedézie Maximovičova)

Lespedeza melanantha

Lespedeza nipponica

oblasti: Japonsko

Lespedeza pilosa

Lespedeza potaninii

Lespedeza procumbens

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína , Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína , Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou trojčetné, oválného tvaru, dlouhé 1,2 - 2,5cm. Kvete růžovofialovými nebo bílými květy o velikosti 6mm v hroznu.

Vyhovuje mu chladnější místo ve stínu s vlhkou půdou bohatou na živiny.

Množí se semeny nebo dělením na jaře.

Lespedeza repens

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Lespedeza stuevei

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Lespedeza texana

oblasti: Texas

Lespedeza thunbergii (Lespedézie Thunbergrova)

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Virginie, Wisconsin

Roste v podobě polokeře. Dorůstá výšky 1 - 1,8m. Větve jsou převislé. Květenstvím je převislý hrozen nebo lata délky do 70cm a vlastní květy jsou růžově fialové. Plodem je zploštělý lusk. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - květy bílé
- var. obtusifolia

Lespedeza tomentosa

oblasti: Ásám, Hubei, Japonsko, Kašmír, Korea, Pákistán, Přímořský kraj, Sichuan, Yunnan

Roste v Pákistánu, Kašmíru, Indii, Rusku, Číně, Japonsku a Koreji v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Povrch je ochlupený. Palisty jsou ochlupené a dlouhé 4 - 5mm. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé 0,6 - 3,6cm, lístky jsou široce eliptické, zašpičatělé s hrotem, oboustranně ochlupené, dlouhé 2 - 5,3cm a široké 1,2 - 2,6cm. Květenstvím je hrozen nebo lata na 2,5 - 4cm

stopce, listeny jsou ochlupené, dlouhé 1,5mm, vlastní květy mají 1 - 1,5mm stopku, kalich délky 5 - 6mm, zuby nestejně, koruna je bělavá a pavéza dlouhá 8 - 9mm. Plodem je ochlupený lusk.

Lespedeza violacea

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Lespedeza virgata

oblasti: Florida, Severní Karolína

Lespedeza virginica

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Lespedeza x acuticarpa

oblasti: Arkansas, Delaware, Illinois, Kansas, Massachusetts, Michigan, Missouri, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Virginie

Lespedeza x angustifolioides

Lespedeza x brittonii

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Texas, Virginie

Lespedeza x divaricata

Lespedeza x intermixta

Lespedeza x longifolia

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Indiana, Jižní Karolína, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ontario, Severní Karolína, Virginie, Wisconsin

Lespedeza x manniana

oblasti: Arkansas, Illinois, Kansas, Michigan, Missouri, Texas

Lespedeza x neglecta

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Missouri, New York, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Lespedeza x nuttallii

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Lespedeza x oblongifolia

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína, Maryland, New Jersey, New York, Severní Karolína, Tennessee, Virginie

Lespedeza x patentibicolor

Lespedeza x simulata

oblasti: Arkansas, Connecticut, Illinois, Iowa, Kansas, Michigan, Missouri, New Jersey, New York, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Vermont, Virginie

<https://www.rostliny.net/>