

Acer pubinerve

synonyma: *Acer angustilobum* var. *kwangtungense*, *Acer campbellii* subsp. *chekiangensis*, *A. var. apiferum*, *A. var. kwangtungense*, *Acer sinense* subsp. *chekiangense*, *Acer sinense* var. *kwangtungense*, *Acer sinense* var. *pubinerve*

čeleď: Sapindaceae
oblasti: Čína

Pochází z Číny. Roste v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky 7 - 15m. Borka je tmavěhnědá, hladká. Mladé větve holé nebo hustě ochlupené. Listy jsou téměř zaokrouhlené, papírovité, báze srdčitá, 5tilaločné, laloky vejčité nebo dlouze vejčité, na konci ocasovité, střední lalok je dlouhý 4 - 6cm, řapíky jsou žlutě ochlupené, dlouhé 4 - 5cm, celková délka je 10 - 12cm a šířka 11 - 11cm. Květenství je latnaté, holé, kališních lístků je 5, mají vejčitý tvar, tyčinek je 8, semeníky jsou hustě ochlupené. Nažky jsou nažloutle, dlouhé 1,3 - 3,5cm, široké 1,2 - 2cm, křídlo je obvejčité, pozdra semen mají délku 8mm a šířku 1,5cm.

<https://www.rostliny.net/>