

Acer semenovii

synonyma: *Acer ginnala* subsp. *semenowii*, *Acer ginnala* var. *semenowii*, *Acer pusillum*, *Acer tataricum* subsp. *ginnala* var. *semenovii*, *Acer tataricum* subsp. *semenowii*, *Acer tataricum* var. *semenowii*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Afganistán, Čína, J Rusko, JZ Asie, Ťan-šan

Roste v Afganistánu, jižním Rusku a Číně podobě strnulého keře. Dorůstá výšky 3 - 5m. Větve jsou šedohnědé, holé. Listy jsou menší, méně lesklé, hlouběji 3 - 5laločné, vejčité, postranní laloky kratší, spodní listy bývají celokrajné, laloky vejčité a špičaté, pilovité až lalůčkovité, střední lalok má pár vlekých laločnatých zubů, podzimní barva je červená až žlutá, báze téměř srdčitá, řapíky dlouhé 2 - 3cm, celková délka je 12 - 50cm a šířka 10 - 32cm. Kvete v hustých chocholičnatých latách se žláznatými stopkami, nažloutlými květy. Křídla 2nažek svírají téměř pravý úhel a mají délku 3 - 3,5cm.

<https://www.rostliny.net/>