

Acer taronense

synonyma: *Acer chienii*, *Acer chloranthum*, *Acer laxiflorum* var. *longilobum*, *Acer pectinatum* subsp. *taronense*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Čína, Himálaj, Myanmar (Barma)

Roste v Číně, Himálaji a Myanmaru v podobě stromu se širokou korunou. Dorůstá výšky až 20m. Větve jsou tenké, holé, v mládí šedohnědé a ojíněné, později hnědé, načervenalé, neznatelně pruhované. Listy jsou vejčité nebo vejčité podlouhlé, 3 - 5tilaločné, laloky 3úhle vejčité, postranní laloky jen 1/2, horní strana je tmavězelená, spodní na žilnatině hnědě ochlupená, okraj je 2x pilovitý, báze srdčitá, řapíky jsou dlouhé 2 - 6cm, celková délka je 4 - 15cm. Kvete v 30 - 40tičetném květenství. Stopky květů mají délku 6mm, tyčinkové květy obsahují 5 dlouhých kališních lístků, 5 obvejčitých lístků, 8 tyčinek. Plodí v 5 - 8cm dlouhých hroznech s růžofialovými nažkami délky 1,6 - 2,5cm a šířka 6 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>