

Eurybia conspicua

synonyma: Aster conspicuus, Aster forwoodii

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Manitoba, Montana, Oregon, Saskatchewan, Washington, Wyoming

Roste na severozápadě USA a jihozápadě Kanady. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Pod zemí vytváří dřevnatý oddenek. Lodyha je přímá, zřídka větvená, může být i chlupatá, řídce žláznatá a hustě olistěná. Lodyžní listy jsou krátce řapíkaté až přisedlé, v dolní části obkopinaté až obvejčité, na okraji pilovité, dlouhé (4 -) 5,8 - 14 (i 18)cm, široké (0,8 -) 2 - 5 (i 8)cm, horní jsou menší, kopinaté až eliptické. Kvete v úboru složeném z 5 - 50ti kvítků. Květní stopky jsou ochlupené, žláznaté, listenů je 0 - 3ks. Okvětní lístky jsou fialové, střed je hnědý. Plodem je nažka s narůžovělým chmýrem délky 0,9 - 1cm.

Vyhovují ji suché i vlhké louky, světlé jehličnaté i listnaté lesy a dobře snáší jarní požáry.

<https://www.rostliny.net/>