

Acer thomsonii

synonyma: *Acer platanifolium*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Himálaj, Sikkim, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Himálaji a Sikkimu v podobě velkého stromu. Koruna je širší než vyšší. Mladé větve jsou pevné, krátké a tlusté. Listy jsou tenké, v mládí narůžovofialové, 3 - 5laločné, řídce pilovité, báze srdčitá, postranní laloky celokrajné, malé, spodní strana jebledželená, řapíky jsou dlouhé 5 - 20cm a celková délka je 10 - 30cm. Kvete v převisajících květenstvích. Kališní lístky jsou podlouhlé, dlouhé 3mm, široké 1,5mm, okvětní lístky mají podobnou velikost i tvar. Nažky jsou seskupené v 10 - 12cm plodenství a mají délku 8 - 12cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *huianum*/*A. franchetii* var. *majus*/*A. huianum* - Yunnan; okraje mají vlnité laloky
- var. *thomsonii*/*A. sterculiaceum* subsp. *thomsonii*/*A. villosum* var. *thomsonii* - Xizang; laloky s pilovými okraji

<https://www.rostliny.net/>