

Afrocarpus falcatus (Rutye srpatá)

synonyma: A. subsp. gaussenii, Afrocarpus gaussenii, Decussocarpus falcatus, Nageia falcata, Nageia falcata var. gaussenii, Nageia meyeriana, Podocarpus falcatus, Podocarpus gaussenii, Podocarpus gracillimus, Podocarpus meyerianus, Taxus falcata

čeleď: Podocarpaceae

oblasti: Limpopo, Malawi, Mosambik, Svazijsko, Západní Kapsko

Pochází z jižní Afriky. Patří mezi stálezelené dvoudomé stromy s hustou korunou. Dorůstá výšky 10 - 25 (při pobřeží) 45 (vyšší polohy) (i 60)m při průměru kmene 1,8 - 2 (i 3)m. Borka je hnědošedá až načervenalá a odlupuje se v plátcích. Listy vyrůstají ve spirále, jsou úzké, špičaté, zelené nebo nažloutlé, ochlupené, kožovité, mírně voskovité, dlouhé 3,5 - 4,5 (i 5)cm a široké 6mm. Samčí šištice jsou hnědé, mají délku 0,5 - 1,5cm, šířku 3mm, samičí šištice vytvářejí tmavězelená voskovitá semena o velikosti 1 - 1,8 (i 2)cm.

<https://www.rostliny.net/>