

Catananche (Poblekla)

čeleď: Asteraceae

Roste ve středozeší jako jednoletka nebo trvalka. Pod zemí vytváří silný kořen. Listy jsou úzké a vytvářejí přízemní růžici. Květenstvím je úbor s širokými korunními lístky s 5ti zuby na vrcholu a bez terčových květů. Nejznámějším druhem je *C. caerulea*.

Vyhovuje jí plné slunce.

Množí se semeny, dělením nebo kořenovými řízkami.

Catananche arenaria

synonyma: *C. arenaria* var. *atricha*, *C. arenaria* var. *aurea*, *C. arenaria* var. *dimorpha*

Catananche caerulea (Poblekla modrá)

synonyma: *C. caerulea* var. *ochroleuca*, *C. caerulea* var. *propinqua*, *C. caerulea* var. *tenuis*, *C. caerulea* var. *tlemcenensis*, *C. propinqua*, *Cupidonia caerulea*

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko, Středozeší

Roste ve středozeší a jihozápadní Evropě jako krátkověká trvalka (u nás pouze jednoletka). Dorůstá výšky 0,2 - 0,9 (i 1,3)m a šířky 30cm. Pod zemí vytváří tlustý křlovitý kořen, který při poranění roní mléko. Lodyha je vystoupavá, větvená a šedě ochlupená. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou šedozelené, čárkovité, na okrajích s 1 - 2ma páry zubů a lodyžní jsou zubaté. Kvete v úboru o průměru až 6cm vrcholovém květenství, zákrov je zvonkovitý, dlouhý (1,3 -) 1,5 - 2,5 (i 2,6)cm, široký (0,9 -) 1 - 2cm, listeny jsou víceřadé, vejčité, hrotité s tmavou střední žilkou, vnější květy jsou modré a vnitřní tmavě fialové. Plodem je 5třhranná nažka délky 3,5 - 4mm s chmýrem délky 5 - 7 (i 7,5)mm z osinkatých šupinek. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bicolor' - květy bílé s tmavěfialovým středem
- 'Major' - asymetrický habitus; květy tmavěmodré
- 'Perry's White' - květy bílé

Vyhovuje jí hlinitopísčité dobře propustná sušší půda a teplo. Je mrazuvzdorná do -17°C.

Množí se semeny.

Catananche caespitosa

Catananche lutea

synonyma: *C. lutea* subsp. *carpholepis*, *Piptocephalum carpholepis*

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sýrie, Tunisko, Turecko

Patří mezi jednoletky. Listy jsou střídavé. Květenstvím je úbor, zákrov má délku 2,3 - 3,2cm a šířku 0,8 - 1,5cm. Plodem je nažka délky 3 - 3,5mm s chmýrem délky 1 - 1,1cm. Existují vnitrodruhové

taxony:

- subsp. carpholepsis
- subsp. lutea

Catananche montana

synonyma: C. webbii

Další informace:

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=1960>

<https://www.rostliny.net/>