

Catananche caerulea (Poblekla modrá)

synonyma: *C. var. ochroleuca*, *C. var. propinqua*, *C. var. tenuis*, *C. var. tlemcenensis*, *Catananche propinqua*, *Cupidonia caerulea*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko, Středozeví

Roste ve středozemí a jihozápadní Evropě jako krátkověká trvalka (u nás pouze jednoletka). Dorůstá výšky 0,2 - 0,9 (i 1,3)m a šířky 30cm. Pod zemí vytváří tlustý křlovitý kořen, který při poranění roní mléko. Lodyha je vystoupavá, větvená a šedě ochlupená. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou šedozelené, čárkovité, na okrajích s 1 - 2ma páry zubů a lodyžní jsou zubaté. Kvete v úboru o průměru až 6cm vrcholovém květenství, zákrov je zvonkovitý, dlouhý (1,3 -) 1,5 - 2,5 (i 2,6)cm, široký (0,9 -) 1 - 2cm, listeny jsou víceřadé, vejčité, hrotité s tmavou střední žilkou, vnější květy jsou modré a vnitřní tmavě fialové. Plodem je 5tíhranná nažka délky 3,5 - 4mm s chmýrem délky 5 - 7 (i 7,5)mm z osinkatých šupinek. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bicolor' - květy bílé s tmavěfialovým středem
- 'Major' - asymetrický habitus; květy tmavěmodré
- 'Perry's White' - květy bílé

Vyhovuje jí hlinitopísčité dobře propustná sušší půda a teplo. Je mrazuvzdorná do -17°C.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>