

Nepeta nuda (Šanta lesostepní)

synonyma: *Cataria nuda*, *Cataria paniculata*, *Cataria violacea*, *Glechoma nuda*, *Glechoma violacea*, *Nepeta alba*, *Nepeta meda*, *Nepeta mollis*, *Nepeta montana*, *Nepeta nawaschinii*, *N. var. pannonica*, *N. var. violacea*, *Nepeta paniculata*, *Nepeta pannonica*, *Nepeta pontica*, *Nepeta sulphurea*, *Nepeta turkestanica*, *Nepeta violacea*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Česká republika, Írán, Itálie, J Ural, JZ Sibiř, Katalánsko, Německo, Střední Asie

Roste od střední Evropy po jihozápadní Sibiř a střední Asii. Dorůstá výšky 0,4 - 1 (i 1,3)m. Lodyha má 4hranný průřez. Větví se až na vrcholu. Spodní listy jsou k ní přisedlé, mají kopinatý tvar se zubatým okrajem, jsou prakticky přisedlé, dlouhé 5 - 7cm a široké 1,7 - 2,5cm. Kvete v až 15cm jehlancovité, vlastní kvítky jsou pyskaté, kalich dlouhý 3 - 4mm, jeho trubka přímá, cípy přímé, prakticky stejně dlouhé a koruna je bledě modrofialová. Plodem je tvrdka. Patří mezi chráněné druhy C2. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *albiflora*
- subsp. *latifolia*
- subsp. *lydiae*

Vyhovují jí mírně vlhké půdy bohaté na minerály, teplo a světlo, okraje lesů, suché stráně, pastviny, atp.

<https://www.rostliny.net/>