

Larrea

čeleď: Zygophyllaceae

Jedná se o stálezelené pryskyřičnaté keře. Palisty jsou vytrvalé, malé. Listy jsou také malé, vstřícné, zpeřené složené z 1 až několika párů lístků. Kvete samostatnými úžlabními květy s 5ti kališními opadavými lístky a 5ti okvětními lístky. Tyčinek je 10. Semeníky jsou kulovité, krátce stopkaté, ochlupené, 5tilaločné, protažené v šídlovitou čnělku. Plody jsou kulovité, ochlupené až huňaté, 5tilaločné.

Larrea cuneifolia

Larrea divaricata

synonyma: *Covillea divaricata*, *Neoschroetera divaricata*, *Schroeterella divaricata*

oblasti: Argentina, Peru

Roste od Peru po Argentinu. Mladé větve jsou hranaté, přitiskle šedě ochlupené. Listy jsou krátce hrotné, podlouhlé, téměř rovné, dlouhé 0,7 - 1,5cm, široké 2,5 - 5mm, přitiskle šedě ochlupené. Kališní lístky jsou ochlupené, tupé, různě dlouhé v rozsahu 4 - 6mm, široké 3 - 4mm, korunní lístky jsou dlouhé alespoň 4 - 8mm. Plody jsou kulovité, huňatě ochlupené, částečně rozdělené na 5 částí.

Larrea glutinosa

Larrea mexicana

oblasti: Mexiko

Larrea nitida

synonyma: *L. balsamica*, *Mimosa balsamica*

Larrea tridentata

synonyma: *Covillea glutinosa*, *Covillea tridentata*, *L. glutinosa*, *Schroeterella glutinosa*, *Schroeterella tridentata*, *Zygophyllum tridentatum*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko, Texas, Utah

Roste na jihu a jihozápadě USA v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Kolénka jsou zvětšená, vytrvávají. Palisty jsou vejčité, dlouhé 1 - 2mm. Listy vyrůstají po 2 - 3ks, jsou tuhé, dlouhé 0,5 - 1cm, mírně asymetrické, široce zaoblené a řapíky jsou dlouhé 1mm. Stopky květů jsou dlouhé 0,5 - 1cm, kališní lístky jsou dlouhé 6 - 8mm, široce eliptické, na konci zaoblené, korunní lístky žluté, dlouhé 0,8 - 1,2cm, v průměru mají do 2,5cm. Plody jsou hustě bílé nebo hnědožlutě ochlupené, eliptické, dlouhé 4 - 5,5mm. Je nápadně aromatický.

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2344>

<https://www.rostliny.net/>