

Corynopuntia

čeleď: Cactaceae

Corynopuntia aggeria

synonyma: Grusonia aggeria, Opuntia aggeria

oblasti: Coahuila, Texas

Roste v USA a Mexiku v podobě chomáčovitého keře. Dorůstá výšky 3 - 9cm. Kořeny jsou hlízovité, dlouhé 7 - 8cm a široké 2 - 3cm. Kmínky mají články válcovité až kyjovité, dlouhé 3,5 - 9cm, široké 1,5 - 3cm, hrbolky mají velikost 0,8 - 2,2cm, areoly jsou kulaté, průměru 3 - 4mm, ochlupení je žlutobílé, obsahují 1 - 15 trnů délky 3 - 5cm, mohou být bílé, zploštělé až hranaté, centrální bývá zkroucený nebo zahnutý, okrajové jsou vystoupavé, hnědé až černé (i bílé), glochidie žluté, dlouhé do 4cm. Květy mají vnitřní korunní lístky žluté a dlouhé 2,5cm. Plody jsou žluté, později šedé, válcovité až eliptické, dlouhé 2 - 5cm, široké 1 - 1,5cm a obsahují nažloutlá až nahnědlá prakticky kulatá semena průměru do 5mm.

Corynopuntia agglomerata

synonyma: Grusonia agglomerata, Opuntia agglomerata

Corynopuntia bulbispina

synonyma: Grusonia bulbispina, Opuntia bulbispina

oblasti: S Mexiko

Roste v Mexiku v podobě zakrslého polštářovitého keře o průměru do 1,2m. Kmínky mají články vejčité, dlouhé 2 - 2,5cm, široké 1 - 1,2cm, hrbolkaté, trny vyrůstají po 12 - 16ti ks, jsou špinavě bílé a dlouhé do 1,2cm. Kvete růžovofialovými květy.

Corynopuntia clavata

synonyma: Grusonia clavata

oblasti: Arizona, Nové Mexiko

Roste v USA. Vytváří kobercové porosty o šířce 1 - 2m, do výšky dorůstá 5 - 15cm. Články jsou hrbolaté, kyjovité, dlouhé 2,5 - 7,5cm, široké 1,5 - 3cm, hrbolky jsou úzké, dlouhé 0,5 - 1,6cm, areoly mají průměr 3mm, jsou bílé až šedě ochlupené, obsahují 7 - 15 trny, hlavní jsou bílé, zploštělé, dlouhé 1,2 - 3,5cm, ostatní vystoupavé, bílé, žluté až hnědožlutě, hranatě zploštělé až prakticky kulaté, glochidie žlutobílé a dlouhé 4 - 6mm. Květy mají vnitřní korunní lístky žluté a dlouhé do 2,5cm. Plody jsou podlouhlé, soudkovité až eliptické, dužnaté, žluté, dlouze ochlupené, dlouhé 3 - 4,5cm, široké 1,5 - 2,5cm a mají žlutobílá semena délky 4,5mm a šířky 4mm.

Množí se odnožemi vytvářejícími se při bázi.

Corynopuntia dumetorum

synonyma: Grusonia dumetorum, Opuntia dumetorum

Corynopuntia emoryi

synonyma: *C. stanlyi*, *C. stanlyi* var. *wrightiana*, *Grusonia emoryi*, *Grusonia stanlyi*, *Opuntia emoryi*, *Opuntia stanlyi*, *Opuntia stanlyi* var. *peeblesiana*

oblasti: Arizona, Chihuahua, Nové Mexiko, Texas

Roste v USA a Mexiku v podobě polštářovitého keře. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Kmínky mají články zahnuté, kyjovité, dlouhé 7 - 19cm, široké 2,5 - 5cm, hrbolky velikosti 2 - 5cm, areoly průměru 4 - 6mm, bílé až šedě ochlupené, obsahují 12 - 30 žlutých, hnědožlutých až červenohnědých trnů se žlutými špičkami, nejdelší dlouhé 3 - 7cm, glochidie jsou žluté až hnědé a dlouhé 5 - 7mm. Květy mají vnitřní korunní lístky žluté a velikosti 2 - 3cm. Plody jsou žluté, válcovité až eliptické, dužnaté, zpravidla beztrnné, obvykle hustě žlutě ochlupené, dlouhé 4 - 9cm, široké 1,4 - 4cm a obsahují žlutobílá až žlutá semena délky 5 - 6mm a šířky 3,5 - 4mm.

Corynopuntia grahamii

synonyma: *C. planibulbispina*, *Grusonia grahamii*, *Opuntia grahamii*, *Opuntia schottii* var. *grahamii*

oblasti: Chihuahua, Durango, Nové Mexiko, Texas

Roste v USA a Mexiku v podobě polštářovitého keře. Dorůstá výšky 8 - 20cm. Pod zemí vytváří hlízu délky do 9cm a šířky 2cm. Kmínky mají články válcovité, zahnuté, dlouhé 3 - 7cm, široké 1,5 - 3,5cm, hrbolky mají velikost 1 - 1,5cm, areoly mají v průměru 3mm, jsou bílé až nažloutle ochlupené, obsahují 6 - 15 trnů, jsou bílé, žluté, hnědožluté nebo hnědočervené, nejdelší mají délku 3 - 5,5cm, glochidie jsou bílé až žluté a dlouhé do 6mm. Květy mají vnitřní korunní lístky žluté a dlouhé 2 - 2,5cm. Plody jsou nažloutlé, válcovité až eliptické, dlouhé 2 - 3,5cm, široké 1,2 - 2cm, dužnaté, žlutě ochlupené a obsahují žlutá semena délky 4 - 5mm a šířky 3 - 4mm.

Corynopuntia invicta

synonyma: *Grusonia invicta*, *Opuntia invicta*

oblasti: SZ Mexiko

Roste v Mexiku na Kalifornském poloostrově v podobě keře. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Články jsou obvejčité až kyjovité, hrbolaté, dlouhé 6 - 10cm, široké 2 - 6cm, listy sídlovité, načervenalé (později hnědé) a zploštělé trny po 16 - 22ks délky do 3,5cm. Kvete žlutými květy.

Corynopuntia kunzei

synonyma: *C. stanlyi* var. *kunzei*, *Grusonia kunzei*, *Grusonia wrightiana*, *Opuntia kunzei*, *Opuntia kunzei* var. *wrightiana*, *Opuntia stanlyi* var. *kunzei*, *Opuntia stanlyi* var. *wrightiana*, *Opuntia wrightiana*

oblasti: Arizona, Kalifornský záliv, Sonora

Roste v USA a Mexiku v podobě polštářovitého až trsovitého keře. Dorůstá výšky do 50cm. Kmínky mají články zahnuté, válcovité, dlouhé 7 - 15cm, široké 2 - 4cm, hrbolky jsou úzké, mají velikost 2 - 3cm, areoly mají průměr 5 - 6mm, jsou šedobíle ochlupené, obsahují 16 - 33 trny, hlavní jsou hnědožluté, na okraji bělavé, zploštělé, dlouhé do 4,5cm, ostatní hnědožluté až červenožluté, nejdelší do 5cm, glochidie chudé, žluté a dlouhé 5 - 6mm. Květy mají vnitřní korunní lístky žluté až

světle žlutozelené a dlouhé do 1,5 - 2cm. Plody jsou žluté, dužnaté, trnité, dlouhé 4 - 8cm, široké 1,5 - 4cm a obsahují žlutobílá semena délky 4 - 5mm a šířky 3,5 - 4,5mm.

Corynopuntia marenae

synonyma: Grusonia marenae, Marenopuntia marenae, Opuntia marenae, Pterocactus marenae

oblasti: SZ Mexiko

Roste v Mexiku v podobě keře. Dorůstá výšky 15 - 60cm. Články jsou dlouhé do 20 a drobně hrbolkaté. Listy jsou dlouhé 0,5 - 1cm, trny jsou po několika přitisklé, dlouhé 0,3 - 1cm, 1 - 2ks i více jsou silnější a dlouhé až 2cm. Kvete bělavými květy.

Corynopuntia moelleri

synonyma: Grusonia moelleri, Opuntia moelleri

Corynopuntia parishii

synonyma: C. stanlyi var. parishii, Grusonia parishii, Opuntia parishii, Opuntia stanlyi var. parishii

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Sonora, Utah

Roste v USA a Mexiku v Mohavské a Sonorské poušti. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Články jsou kyjovité, dlouhé 5 - 9cm, široké 2 - 3cm, hrbolky dlouhé 1,5 - 2,5cm, areoly mají průměr 5mm, bíle ochlupené, obsahují 14 - 22 bílých až nahnědlých trnů se žlutou špičkou, hlavní jsou zahnuté, zploštělé, bíle lemované, délky 2,5 - 5,8cm, ostatní jsou prakticky černé až hnědé nebo hnědožluté, dlouhé do 4,2cm, glochidie žluté a dlouhé 5 - 8mm. Květy mají vnitřní korunní lístky světležluté s úzkým načervenalým pruhem uprostřed a dlouhé 1,5 - 2,2cm. Kvete světložlutými květy. Plody jsou žluté, dlouhé 3,5 - 5,5 (i 8)cm, široké 1,5 - 2cm, dužnaté, žlutě ochlupené a obsahují žlutobílá semena délky 4 - 5mm a šířky 3,5 - 4,5mm.

Corynopuntia reflexispina

synonyma: Grusonia reflexispina, Opuntia reflexispina

Corynopuntia schottii

synonyma: Grusonia schottii, Opuntia schottii

oblasti: Coahuila, Texas

Roste v USA a Mexiku v podobě polštářovitého keře. Dorůstá výšky 7,5 - 9cm. Kmínky mají kyjovité články délky 2 - 6,5cm, šířky 1,5 - 3cm, hrbolky mají velikost 0,8 - 2cm, areoly mají průměr 2,5 - 4mm, jsou bíle až nažloutle ochlupené, obsahují 11 - 17 trnů, mohou být zahnuté, bílé, hnědožluté až hnědočervené, nejdelší dlouhé 3 - 7cm, glochidie jsou žlutobílé až žluté a dlouhé 7mm. Květy mají vnitřní korunní lístky žluté a dlouhé 2cm. Plody jsou žluté, válcovité až eliptické, dužnaté, dlouhé 3 - 5cm, široké 1 - 3cm, občas mají 3 - 6 bílých až červených trnů délky 6mm, žlutě ochlupené a obsahují žlutobílá až žlutá semena délky 4,5 - 5mm a šířky 3,5mm.

Corynopuntia vilis

synonyma: C. vilis var. bernhardinii, Grusonia vilis, Opuntia vilis

oblasti: S Mexiko

Roste v Mexiku. Podobá se *O. bulbispina*, ale články jsou kyjovité a dlouhé do 5cm.

Další informace:

http://www.cact.cz/galerie_test/detail.php?id=485

<https://www.rostliny.net/>