

Corynopuntia kunzei

synonyma: *Corynopuntia stanlyi* var. *kunzei*, *Grusonia kunzei*, *Grusonia wrightiana*, *Opuntia kunzei*, *Opuntia kunzei* var. *wrightiana*, *Opuntia stanlyi* var. *kunzei*, *Opuntia stanlyi* var. *wrightiana*, *Opuntia wrightiana*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Arizona, Kalifornský záliv, Sonora

Roste v USA a Mexiku v podobě polštářovitého až trsovitého keře. Dorůstá výšky do 50cm. Kmínky mají články zahnuté, válcovité, dlouhé 7 - 15cm, široké 2 - 4cm, hrbolky jsou úzké, mají velikost 2 - 3cm, areoly mají průměr 5 - 6mm, jsou šedobíle ochlupené, obsahují 16 - 33 trny, hlavní jsou hnědožluté, na okraji bělavé, zploštělé, dlouhé do 4,5cm, ostatní hnědožluté až červenožluté, nejdelší do 5cm, glochidie chudé, žluté a dlouhé 5 - 6mm. Květy mají vnitřní korunní lístky žluté až světle žlutozelené a dlouhé do 1,5 - 2cm. Plody jsou žluté, dužnaté, trnité, dlouhé 4 - 8cm, široké 1,5 - 4cm a obsahují žlutobílá semena délky 4 - 5mm a šířky 3,5 - 4,5mm.

<https://www.rostliny.net/>