

Cytinus hypocistis (Ozorna obecná)

synonyma: *Asarum hypocistis*, *C. f. solaris*, *C. subsp. ochraceus*, *C. var. lutea*, *C. var. ochraceus*, *Hypocistis hypocistis*, *Hypocistis lutea*

čeleď: *Cytinaceae*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Chorvatsko, Francie, Itálie, Izrael, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Palestina, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sýrie, Tunisko

Roste v celém středozeří jako parazitická jednodomá trvalka v trsech. Dorůstá výšky 3 - 12 (i 15)cm. Stonek je vzpřímený a válcovitý, pokrytý hustě úzce vejčitými střechovitě se překrývajícími dužnatými šupinami v barvě žluté, oranžové nebo červené. Kvete jednopohlavnými žlutými, bílými nebo narůžovělými 4četnými květy v 5 - 10 (i 12)tičetném klasovitém květenství, korunní lístky jsou mírně vejčité, ochlupené a na okraji trásnitě a samčí jsou umístěné nad samičími. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *clusii* - okvěť bělavé nebo narůžovělé; růžově kvetoucí cisty
- subsp. *hypocistis* (Ozorna obecná pravá) - okvěť žluté; bíle kvetoucí cisty a devaterníkovce
- subsp. *kermesinus*
- subsp. *macranthus*
- subsp. *orientalis*
- subsp. *pityusensis*

Parazituje na kořenech cistů nebo devaterníkovců.

<https://www.rostliny.net/>