

## Scolymus hispanicus (Ostnatec střeozemní)

synonyma: *Myscolus microcephalus*, *Scolymus aggregatus*, *Scolymus congestus*, *Scolymus grandiflorus*, *Scolymus gymnospermus*, *S. var. aggregatus*, *S. var. aurantiacus*, *Scolymus perennis*, *Scolymus theophrasti*, *Scolymus vivax*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Černé moře, Egypt, Francie, Gruzie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Makaronésie, Makedonie, Maroko, New York, Pennsylvania, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Turecko, Ukrajina

Roste ve střeozemí a západní Evropě jako dvouletka nebo krátkověká trvalka a zavlečen byl do Severní Ameriky. Dorůstá výšky 0,2 - 1,2 (i 2)m. Stonky i listy jsou ostnité. Lodyha je vystoupavá až přímá a větvená. Listy v přízemní růžici jsou peřenosečné, dlouhé do 12cm, lodyžní jsou střídavé, peřenodílné až peřenosečné, ostnité, u centrální žilky bělavé, 1/2objímavé a sbíhavé. Kvete žlutými pouze jazykovitými květy s 5ti zoubky na vrcholu v úboru o průměru 2 - 3cm se 3mi ostnitými listeny, zákrov má průměr 1,5 - 2cm a zákrovní listeny jsou šídlovité. Plodem je nažka délky (2 -) 3 (i 4)mm s chmýrem. Při poranění roní bílý latex. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *hispanicus* (Ostnatec střeozemní pravý)
- subsp. *occidentalis*

Vyhovují mu suché stráně, okraje cest a polí, atp.

<https://www.rostliny.net/>