

Cercocarpus betuloides (Ohaňkovník břízový)

synonyma: *Cercocarpus montanus* var. *glaber*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kalifornský záliv, Oregon

Pochází z USA. Roste v podobě keře nebo malého stromu. Listy jsou úzce obvejčité až téměř okrouhlé, skoro holé až hřebíkatě ochlupené, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek. Kališní trubka má délku až 1,4cm a lem má průměr 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *betuloides*/*C. douglasii*/*C. parviflorus* - Oregon až Mexiko; keř nebo malý strom; výška do 7m; borka tlustá; větve v mládí měkce ochlupené; listy obvejčité, dlouhé 1 - 3cm, na konci zubaté, horní strana zelená, v mládí řídko ochlupená, spodní strana měkce ochlupená, nápadně žilkovaná; kvete po 2 - 3ks ve svazku

- var. *blancheae*/*C. alnifolius*/*C. montanus* subsp. *blancheae*/*C. montanus* var. *blancheae* - jižní Kalifornie; velký keř nebo malý strom; výška 2 - 10m; listy široce eliptické až vejčité, dlouhé 3 - 5cm, kožovité, horní strana tmavězelená, holá, spodní strana bledší, téměř holá

- var. *traskiae*/*C. montanus* var. *traskiae*/*C. traskiae* - Kalifornie; výška až 7m; větve v mládí červenohnědé, ochlupené; listy oválné až okrouhlé či široce obvejčité, dlouhé 3 - 6cm, okraj strašících listů stočený, horní strana tmavězelená, spodní strana bíle plstnatá; trubka kalicha dlouhá až 1,1cm, lem má v průměru do 7mm

<https://www.rostliny.net/>