

Chamaebatiaria (Řebřolístek)

čeleď: Rosaceae

Existuje 1 pouze druh. Roste v USA v podobě keře nebo polokeře. Větve jsou žláznatě ochlupené. Listy jsou 2x zpeřené anebo jsou pouze hluboce laločnaté. Květy mají 60 tyčinek, kališní lístky vzpřímené. Plodenství tvoří 5 měchýřkovitých tobolek.

Je mrazuvzdorný, ale u nás je jistější zimní ochrana. Vyhovuje mu dobře propustná půda, plné slunce a chráněné místo.

Množí se polodřevitými řízkami nebo semeny.

Chamaebatiaria millefolium (Řebřolístek řebříčkový)

synonyma: *Basilima millefolium*, *C. glutinosa*, *Sorbaria millefolium*, *Spiraea glutinosa*, *Spiraea millefolium*

oblasti: Arizona, Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Utah

Roste v USA v podobě opadavého aromatického řídkého keře či polokeře. Dorůstá výšky 0,5 - 2 (i 3)m. Větve jsou v mládí žláznatě, hvězdovitě ochlupené. Palisty jsou obkopynaté, dlouhé 1 - 5mm, celokrajné. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, dlouze kopinaté, dlouhé 2 - 9cm, v mládí jemně 2x zpeřené nebo hluboce zastříhované, úkrojky dlouhé 1 - 2mm, někdy zubaté. Květy bílé v koncových, plstnatě žláznatých 8 - 15cm dlouhých latách, na šířku mají 1,5cm, kališní lístky jsou špičaté, dlouhé 2,5 - 3,6mm, korunní jsou dlouhé 2,5 - 6mm a tyčinek je 50. Plodem je měchýřek.

Vyhovují mu křoviny, skalnaté stráně, borové nebo jalovcové lesy, atp. a to na plném slunci v chudé suché půdě.

Množí se semeny, řízkování je obtížné.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/chamaebatiaria-millefolium/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=370>

<https://www.rostliny.net/>