

Chamaebatiaria millefolium (Řebřolístek řebříčkový)

synonyma: Basilima millefolium, Chamaebatiaria glutinosa, Sorbaria millefolium, Spiraea glutinosa, Spiraea millefolium

čeleď: Rosaceae

oblasti: Arizona, Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Utah

Roste v USA v podobě opadavého aromatického řídkého keře či polokeře. Dorůstá výšky 0,5 - 2 (i 3)m. Větve jsou v mládí žláznaté, hvězdovitě ochlupené. Palisty jsou obkopynaté, dlouhé 1 - 5mm, celokrajné. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, dlouze kopinaté, dlouhé 2 - 9cm, v mládí jemně 2x zpeřené nebo hluboce zastříhované, úkrojky dlouhé 1 - 2mm, někdy zubaté. Kvete bílými květy v koncových, plstnatě lžáznatých 8 - 15cm dlouhých latách, na šířku mají 1,5cm, kališní lístky jsou špičaté, dlouhé 2,5 - 3,6mm, korunní jsou dlouhé 2,5 - 6mm a tyčinek je 50. Plodem je měchýřek.

Vyhovují mu křoviny, skalnaté stráně, borové nebo jalovcové lesy, atp. a to na plném slunci v chudé suché půdě.

Množí se semeny, řízkování je obtížné.

<https://www.rostliny.net/>