

Cocculus hirsutus

synonyma: *Cebatha hirsuta*, *Cebatha villosa*, *Cocculus aristolochiae*, *Cocculus hastatus*, *Cocculus hirsutus*, *Cocculus holopeira-torrída*, *Cocculus linnaeanus*, *Cocculus sepium*, *Cocculus villosus*, *Menispermum hirsutum*

čeleď: Menispermaceae

oblasti: Afrika, Indie, Pákistán

Pochází z tropické Afriky. Roste v podobě zpravidla ochlupené liány. Dorůstá výšky min. 5m. Listy jsou vejčité, občas 3 - 5tilaločné, tupé až hrofité, v mládí hustě ochlupené, na bázi srdčité až uťaté a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2,5cm. Květy jsou žlutozelené, seskupené v 0,5 - 2,5mm dlouhých vrcholících, samčí mají délku 1,5 - 2,5mm, kališní lístky ochlupené, 3 vnější úzce kopinaté, dlouhé 1,5 - 2mm, široké 0,5 - 0,8mm, 3 vnitřní široce vejčité, dlouhé 1,5 - 2,5mm, široké 1,7 - 2mm, korunní lístky úzce vejčité, dlouhé 0,5 - 1,5mm, široké 0,3 - 6mm, ochlupené, samičí vyrůstají po 1 - 3ks (i v hroznech s čárkovitými listeny) a mají velikost 0,5 - 1mm. Plodem je růžová vejčitá peckovice délky 4 - 8mm a šířky 4 - 5mm.

<https://www.rostliny.net/>