

# Anaphalis (Anafálka)

čeleď: Asteraceae

Roste ve střední a jižní Asii jako trvalka, pouze 1 v Severní Americe (*A. margaritacea*). Dorůstá výšky 15 - 75cm. Povrch je šedě plstnatý. Stonky jsou slabé. Listy jsou šedozelené a úzce kopinaté. Květenstvím je chocholík z malých kulovitých úborů, zpravidla se žlutým terčem.

Potřebuje přímé slunce a sušší dobře propustnou štěrkovitou půdu.

Množí se semeny nebo dělením.

## Anaphalis acutifolia

### Anaphalis adnata

synonyma: *A. esquirolii*, *A. sericeo-albida*, *A. sericeoalba*, *Gnaphalium adnatum*, *Gnaphalium esquirolii*, *Gnaphalium formosanum*, *Gnaphalium sericeoalbidum*

oblasti: Bhútán, Čína, Indie, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Thajsko

Roste v Pákistánu, Indii, Nepálu, Bhútánu, Číně, Myanmaru s přesahem do Thajska v podobě polokeře. Dorůstá výšky (15 -) 25 - 50 (i 60)cm. Stonek je vzpřímený, občas větvený a ochlupený. Listy jsou střídavé, špičaté, kožovité, oboustranně ochlupené, horní úzce kopinaté, dlouhé 2 - 4,5cm, široké 0,7 - 1,5 (i 2)cm, spodní obvejčité nebo kopinaté, dlouhé (2,5 -) 3 - 6 (i 7,5)cm a široké 1 - 2,5cm. Květy samičích květů jsou světležluté a dlouhé 2,5 - 3mm.

## Anaphalis alpicola

### Anaphalis araneosa

synonyma: *Antennaria semidecurrens*

## Anaphalis arfakensis

### Anaphalis aristata

synonyma: *Gnaphalium aristatum*

### Anaphalis aureopunctata

synonyma: *A. aureopunctata* f. *calvescens*, *A. pterocaulon* var. *calvescens*, *A. pterocaulon* var. *intermedia*, *A. sinica* subsp. *intermedia*, *A. sinica* var. *calvescens*

## Anaphalis barnesii

## Anaphalis batangensis

## Anaphalis beddomei

## Anaphalis bicolor

synonyma: *A. bicolor*, *Gnaphalium bicolor*

## Anaphalis boissieri

oblasti: Afganistán, Kašmír, Pákistán

Roste v Afganistánu, Pakistánu a Kašmíru jako na bázi dřevnatějící trvalka. Dorůstá výšky 15 - 50cm. Stonek je vzpřímený, bohatě větvený a v horní části ochlupený. Listy jsou úzce kopinaté, na spodní straně ochlupené. horní dlouhé 1,5 - 5cm, široké 1 - 2cm a spodní jsou širší. Samičí květy mají korunu světlehnědou, dlouhou 2 - 3mm a trubka má laloky délky 1,8 - 2,8mm.

## Anaphalis brevifolia

synonyma: *A. bournei*, *Gnaphalium brevifolium*

## Anaphalis bulleyana

synonyma: *Conyza mollis*, *Pluchea bulleyana*

## Anaphalis busua

synonyma: *A. arenosa*, *A. busua*, *A. semidecurrrens*, *Antennaria villosissima*, *Gnaphalium busua*, *Gnaphalium busum*, *Gnaphalium busuum*, *Gnaphalium semidecurrrens*, *Gnaphalium villosissima*

oblasti: Ásám, Bhútán, Himálaj, Kašmír, Myanmar (Barma), Pákistán

Roste od Pakistánu přes Himálaj po Bhútán a Myanmar jako krátkověká trvalka nebo polokeř. Dorůstá výšky (14 -) 20 - 60 (i 70)cm. Listy jsou úzce kopinaté až obkopinaté, špičaté, z obou stran ochlupené, dlouhé (1,7 -) 2 - 10cm a široké 2 - 8mm. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka.

## Anaphalis candollei

## Anaphalis cavei

## Anaphalis chilensis

## Anaphalis chitralensis

oblasti: Pákistán

Roste v Pakistánu jako bohatě větvená dřevnatějící trvalka. Dorůstá výšky 40 - 60cm. Větve jsou ochlupené. Listy jsou dlouhé 0,7 - 2,2cm, široké 1 - 2mm, horní bývají menší, čárkovité až úzce

kopinaté. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka.

Anaphalis chlamydophylla

Anaphalis chungtienensis

Anaphalis cinerascens

Anaphalis contorta

synonyma: A. falconeri, A. tenella, Antennaria contorta, Antennaria tenella, Gnaphalium contortum, Gnaphalium simplicicaule, Gnaphalium tenellum

oblasti: Bhútán, Čína, Filipíny, Indie, Nepál, Pákistán

Roste v Pákistánu, Indii, Nepálu, Bhútánu, Indii a Filipínách jako dřevnatějící zpravidla větvená ochlupená trvalka. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 40cm. Listy jsou bohaté, úzce čárkovité až podlouhlé, špičaté, na spodní straně ochlupené, dlouhé 1 - 3 (i 4)cm a široké 1 - 5mm. Květenstvím je úbor průměru 3 - 4,5 (i 5)mm. Plodem je nažka.

Anaphalis contortiformis

Anaphalis cooperi

Anaphalis corymbifera

Anaphalis cuneifolia

Anaphalis cutchica

Anaphalis darvasica

Anaphalis delavayi

synonyma: Gnaphalium delavayi

Anaphalis depauperata

Anaphalis deserti

Anaphalis elegans

Anaphalis flaccida

Anaphalis flavescens

Anaphalis fruticosa

Anaphalis garanica

Anaphalis gracilis

Anaphalis griffithii

synonyma: *A. royleana*, *Gnaphalium griffithii*

Anaphalis hancockii

synonyma: *A. bodinieri*, *Gnaphalium bodinieri*

Anaphalis hellwigii

synonyma: *A. lorentzii*, *A. lorentzii* f. *angustifolia*

Anaphalis himachalensis

Anaphalis honda

Anaphalis hookeri

Anaphalis horaimontana

Anaphalis javanica

synonyma: *A. javanica*, *Antennaria javanica*, *Antennaria saxatilis* var. *latifolia*, *Antennaria saxatilis* var. *robusta*, *Coreopsis emarcida*, *Gnaphalium javanicum*, *Gnaphalium reinwardtii*

oblasti: Jáva, Lombok, Sulawesi (Celebes), Sumatra

Patří mezi stálezelené endemity Indonésie, především z hornatých částí ostrovů Jáva, jižní Sumatra, jižní Sulawesi a Lombok. Dokáže dorůst do výšky 8m, ale většinou je nižší než 1m. Povrch je stříbřitě ochlupený. Listy jsou úzké.

Anaphalis kashmiriana

oblasti: Pákistán

Roste v Pakistánu jako vzpřímená bohatě větvená trvalka. Dorůstá výšky do 30cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou střídavé až prakticky vstřícné, dlouhé 1 - 5cm, široké 3 - 8mm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka.

### Anaphalis kokonorica

### Anaphalis lactea

synonyma: A. apoensis, A. apoiensis

### Anaphalis larium

### Anaphalis latialata

### Anaphalis latifolia

### Anaphalis lawii

synonyma: A. oblonga var. lawii

### Anaphalis leptophylla

synonyma: Helichrysum leptophyllum

### Anaphalis likiangensis

synonyma: A. nervosa, Gnaphalium likiangense

### Anaphalis longiflora

### Anaphalis longifolia

synonyma: A. zollingeri, A. zollingeriana, Gnaphalium cinerascens, Gnaphalium longifolium

### Anaphalis lorentzii

### Anaphalis marcescens

synonyma: A. linearis, Gnaphalium cinnamomeum, Gnaphalium marcescens

### Anaphalis margaritacea (Plesnivka perlová)

synonyma: A. angustifolia, A. cinnamomea, A. japonica, A. lanata, A. margaritacea var. angustior, A. margaritacea var. occidentalis, A. margaritacea var. revoluta, A. margaritacea var. subalpina, A.

margaritaceae subsp. yedoensis, A. occidentalis, A. sierrae, A. subalpina, A. timmua, A. yedoensis, Antennaria cinnamomea, Antennaria margaritacea, Antennaria margaritacea var. subalpina, Antennaria plantaginea, Antennaria timmua, Gnaphalium americanum, Gnaphalium boreale, Gnaphalium hypophaeum, Gnaphalium margaritaceum, Gnaphalium timmua, Gnaphalium wightianum, Helichrysum margaritaceum

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Bhútán, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Indie, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Korea, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nepál, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Srí Lanka, SV Asie, Tennessee, Utah, V Rusko, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Xizang (Tibet), Yukon, Západní Virginie

Roste v Severní Americe a severovýchodní Asii jako trvalka. Patří mezi dvoudomé rostliny. Dorůstá výšky 1m, obvykle 30 - 60 (i 80)cm a šířky 60cm. Lodyha dřevnatá a je bohatě olistěná. Listy jsou střídavé, čárkovité až dlouze kopinaté s podvinutými okraji, špičaté, dlouhé (1,5 -) 3 - 10cm, široké 0,6 - 2cm a na spodní straně jsou plstnaté. Kvete bílými květy se žlutým středem v 0,8 - 1cm úboru s délkou 0,8 - 1cm seskupenými do chocholičnaté laty, zákrovní listeny jsou bílé, koruna žlutá. Plodem je nažka s chmýrem. Je vhodná k sušení. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. angustior
- 'Neuschnee' - květy bílé
- subsp. yedoensis

Vyhovuje jí plné slunce nebo mírný polostín a dobře propustná vápenitá půda.

Množí se dělením oddenků.

## Anaphalis margaritaceae

### Anaphalis maxima

synonyma: Gnaphalium maximum

### Anaphalis meeboldii

### Anaphalis morrisonicola

synonyma: A. buisanensis, A. contorta var. morrisonicola, A. margaritacea f. morrisonicola, A. margaritacea f. nana, A. margaritacea subsp. morrisonicola

### Anaphalis mucronata

### Anaphalis muliensis

synonyma: A. yunnanensis var. muliensis

### Anaphalis nagasawai

synonyma: *Gnaphalium niitakayamense*, *Gnaphalium nutakayamense*

### Anaphalis neelgerryana

synonyma: *Gnaphalium neelgerryanum*, *Gnaphalium nilagiricum*

### Anaphalis nepalensis

synonyma: *A. intermedia*, *A. mairei*, *A. mucronata* var. *polycephala*, *A. nepalensis*, *A. nepalensis* var. *cuneifolia*, *A. nubigena* var. *intermedia*, *A. nubigena* var. *polycephala*, *A. triplinervis* var. *intermedia*, *Antennaria triplinervis* var. *cuneifolia*, *Antennaria triplinervis* var. *intermedia*, *Elichrysum nepalense*, *Gnaphalium cuneifolium*, *Gnaphalium donianum*, *Gnaphalium intermedium*, *Helichrysum nepalense*, *Helichrysum stoloniferum*

oblasti: Nepál, Pákistán, V Himálaj

Roste ve východním Himálaji v trsech. Dorůstá výšky 5 - 30 (i 50)cm. Stonek může být chudě větvený a povrch je ochlupený. Spodní listy jsou mírně eliptické až lžičkovité, zpravidla řapíkaté, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 0,3 - 2cm, spodní strana je ochlupená a žilnatinu tvoří 1 - 3 žilky. Květenství tvoří 1 - 15 úborů v chocholíku, okvětní lístky jsou bílé a terč je žlutý. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *nepalensis* - listy řapíkaté
- var. *monocephala* - listy přisedlé

### Anaphalis notoniana

synonyma: *Gnaphalium innominatum*, *Gnaphalium notonianum*, *Helichrysum notonianum*

### Anaphalis nubigena

synonyma: *A. mucronata*

### Anaphalis oxyphylla

### Anaphalis pachylaena

### Anaphalis pannosa

### Anaphalis patentifolia

oblasti: Afganistán, Pákistán

Roste v Afganistánu a Pakistánu v podobě ochlupeného šedého polokeře. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 20cm. Stonky jsou vzpřímené až rozkladité a větvené. Listy odstávají vodorovně, jsou šedé až šedozeleňé, úzce obkopynaté, dlouhé 1 - 1,5 (i 2)cm, široké 1 - 2mm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je růžový úbor průměru 3 - 4mm a délky 3 - 5mm. Plodem je nažka.

Anaphalis pedicellatum

Anaphalis pelliculata

Anaphalis plicata

Anaphalis porphyrolepis

Anaphalis pseudocinnamomea

Anaphalis racemifera

Anaphalis rhododactyla

Anaphalis roseo-alba

synonyma: *A. aurora*, *A. roseo-alba* var. *siomensis*

oblasti: Afganistán, Pákistán, Pamír, Tádžikistán

Roste v Tádžikistánu, Afganistánu a Pakistánu jako bohatě větvená trvalka s dřevnatou bází a ochlupeným povrchem. Větve dorůstají délky 15 - 30cm a 0,5 - 1cm články. Listy vyrůstají vodorovně, jsou úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 1,2 - 5cm a široké 2 - 5mm. Květenstvím je narůžovělý úbor průměru 2 - 3mm a délky 2 - 4mm na 1 - 4mm stopce. Plodem je nažka.

Anaphalis royleana

synonyma: *A. chionantha*, *A. polylepis*, *Gnaphalium canum*, *Gnaphalium chionanthum*

oblasti: Pákistán

Roste v podobě od báze větvené trvalky. Dorůstá výšky do 35cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou čárkovité až podlouhlé, špičaté, dlouhé 0,7 - 3 (i 4)cm, široké 1 - 2 (i 4)mm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *cana*
- var. *concolor*
- var. *royleana*

Anaphalis sarawschanica

synonyma: *Antennaria sarawschanica*

Anaphalis saxatilis

synonyma: *Antennaria saxatilis*, *Gnaphalium saxatile*

## Anaphalis scopulosa

oblasti: Pákistán, Pamír, Tádžikistán

Roste v Tádžikistánu a Pakistánu jako polokeř. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Povrch je ochlupený. Stonky jsou vzpřímené, větvené a v horní části ochlupené. Listy jsou úzce kopinaté, řídce ochlupené, zelené, dlouhé 1 - 3cm, široké 1 - 4mm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je úbor průměru 3 - 6mm a délky 3 - 4mm na 2 - 4mm stopce. Plodem je nažka. s chmýrem délky 2,8 - 3,2mm.

## Anaphalis sinica

synonyma: *A. possietica*, *A. pterocaulon*, *A. pterocaulon* var. *sinica*, *Gnaphalium pterocaulon*

## Anaphalis souliei

## Anaphalis spodiophylla

## Anaphalis staintonii

oblasti: Kašmír, Pákistán

Roste v Pakistánu a Kašmíru v podobě šedavého ochlupeného polokeře. Dorůstá výšky (25 -) 30 - 40 (i 70)cm. Stonek je vzpřímený až vystoupavý a větvený. Listy jsou vzpřímené, čárkovité, špičaté, oboustranně ochlupené, dlouhé 1,2 - 2,7cm a široké 1 - 2mm. Květenstvím je úbor délky 2 - 4mm. Plodem je nažka s chmýrem délky 2,5 - 3,5mm.

## Anaphalis stenocephala

## Anaphalis subdecurrens

synonyma: *A. elliptica*, *A. oblonga*, *A. oblonga* var. *elliptica*, *Gnaphalium ellipticum*, *Gnaphalium indicum*, *Gnaphalium oblongum*, *Gnaphalium subdecurrens*

## Anaphalis subtilis

## Anaphalis subumbellata

## Anaphalis suffruticosa

## Anaphalis sulphurea

synonyma: *A. marcescens* var. *sulphurea*

### Anaphalis surculosa

synonyma: *A. pterocaulon* var. *surculosa*

### Anaphalis szechuanensis

### Anaphalis tenuicaulis

### Anaphalis tenuisissima

synonyma: *Antennaria serawschanica*

### Anaphalis thwaitesii

synonyma: *Gnaphalium wightii*

### Anaphalis tibetica

### Anaphalis transnokoensis

### Anaphalis travancorica

### Anaphalis triplinervis

synonyma: *Antennaria triplinervis*, *Gnaphalium cuneatum*, *Gnaphalium cynoglossoides*, *Gnaphalium nepalense*, *Gnaphalium perfoliatum*, *Gnaphalium quintuplinerve*

oblasti: Bhútán, Himálaj, Indie, Nepál, Pákistán, Xizang (Tibet)

Pochází z Himálaje z Indie, Pakistánu, Nepálu, Bhútánu a Tibetu. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 25 - 40 (i 75)cm. Stonek je větvený. Listy jsou eliptické, bledězelené, spodní dlouhé 4 - 6cm, spodní strana je plstnatá, žilnatinu tvoří 3 - 5 (i 7) žilek vyrůstající od báze, horní jsou dlouhé 1,2 - 1,5cm a široké 0,4 - 1cm. Květenstvím je bohatý chocholík složený bílých úborů se žlutým středem. Plodem je nažka s chmýrem délky 3 - 3,5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Sommerschnee' - výška 30cm; listy kratší a více plstnaté

Potřebuje polné slunce a sušší půdu.

### Anaphalis velutina

### Anaphalis virens

### Anaphalis virgata

synonyma: *A. stoliczkai*

oblasti: Afganistán, Bhútán, Kašmír, Pákistán, Xizang (Tibet)

Roste v Afganistánu, Pakistánu, Kašmíru, Tibetu a Bhútánu jako dřevnatějící zejména na bázi větvená trvalka. Dorůstá výšky 18 - 45 (i 55)cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou úzce kopinaté, špičaté, oboustranně ochlupené, horní dlouhé 0,8 - 3cm, široké 0,5 - 2mm, spodní dlouhé 1 - 4cm a široké 1 - 3mm. Květenstvím je úbor průměru 2 - 4mm a délky 2 - 6mm. Plodem je nažka s chmýrem délky 2,5 - 3mm.

### Anaphalis viridis

### Anaphalis viscida

synonyma: *A. sordida*, *Antennaria sordida*, *Antennaria viscida*, *Gnaphalium sordidum*, *Gnaphalium viscidum*

oblasti: Indonésie

Pochází z Indonésie.

### Anaphalis wightiana

synonyma: *Gnaphalium wightianum*

### Anaphalis xylorhiza

### Anaphalis yangii

### Anaphalis yunnanensis

synonyma: *Gnaphalium yunnanense*

### Anaphalis zeylanica

synonyma: *A. wightiana*

Další informace:

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=815>

<http://www.botany.cz/cs/anaphalis-margaritacea/>

<http://www.garten.cz/e/cz/66-plesnivka-anaphalis-triplinervis/>

<https://www.rostliny.net/>