

Maclura cochinchinensis

synonyma: Cudrania cochinchinensis, Cudrania cochinchinensis var. gerontogea, Cudrania fruticosa, Cudrania integra, Cudrania javanensis, Cudrania javanensis var. bancroftii, Cudrania obovata, Cudrania rectispina, Cudrania rumphii, Cudrania spinosus, M. var. gerontogea, Maclura gerontogea, Trophis spinosa, Vanieria cochinchinensis, Vanieria cochinchinensis var. gerontogea

čeleď: Moraceae

oblasti: Čína, JV Asie, Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Číně, jihovýchodní Asii a severní Austrálii. Větve mají trny délky 1 - 3cm. Listy jsou eliptické až obvejčité, hrotitě nebo zašpičatělé, dlouhé 3 - 9cm, široké 1,5 - 4,5cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Samčí kvetenství má průměr 0,5 - 1cm, 5 - 8mm stopku, vlastní květy jsou 4četné, dlouhé 1,5mm, samčí květy přisedlé, 4četné a dlouhé 1,5mm. Plody jsou obvejčité až prakticky kulaté, dlouhé do 8mm a široké 6mm.

<https://www.rostliny.net/>