

Anaphalis nepalensis

synonyma: *Anaphalis intermedia*, *Anaphalis mairei*, *Anaphalis mucronata* var. *polycephala*, *Anaphalis nepalensis*, A. var. *cuneifolia*, *Anaphalis nubigena* var. *intermedia*, *Anaphalis nubigena* var. *polycephala*, *Anaphalis triplinervis* var. *intermedia*, *Antennaria triplinervis* var. *cuneifolia*, *Antennaria triplinervis* var. *intermedia*, *Elichrysum nepalense*, *Gnaphalium cuneifolium*, *Gnaphalium donianum*, *Gnaphalium intermedium*, *Helichrysum nepalense*, *Helichrysum stoloniferum*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Nepál, Pákistán, V Himálaj

Roste ve východním Himálaji v trsech. Dorůstá výšky 5 - 30 (i 50)cm. Stonek může být chudě větvený a povrch je ochlupený. Spodní listy jsou mírně eliptické až lžičkovité, zpravidla řapíkaté, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 0,3 - 2cm, spodní strana je ochlupená a žilnatina tvoří 1 - 3 žilky. Květenství tvoří 1 - 15 úborů v chocholíku, okvětní lístky jsou bílé a terč je žlutý. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *nepalensis* - listy řapíkaté
- var. *monocephala* - listy přisedlé

<https://www.rostliny.net/>