

Antennaria dioica (Kociánek dvoudomý)

synonyma: *Antennaria arida* subsp. *visci*, *A. var. australis*, *A. var. hyperborea*, *A. var. rosea*, *Antennaria hibernica*, *Antennaria hyperborea*, *Antennaria insularis*, *Antennaria microphylla*, *Antennaria montana*, *Antennaria parvifolia* var. *rosea*, *Antennaria rosea* f. *decipiens*, *Chamaezelum dioicum*, *Cyttarium dioicum*, *Gnaphalium alpinum*, *Gnaphalium boreale*, *Gnaphalium dioica*, *Gnaphalium dioicum*, *Gnaphalium hyperboreum*, *Gnaphalium pes-cati*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Aljaška, Andalusie, Asie, Česká republika, Irsko, Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko, Švýcarsko

Roste ve studenějších oblastích Evropy, Asie, ale také na Aljašce jako trvalka a dvoudomá rostlina v kobercových porostech. Dorůstá výšky (2 -) 10 - 20 (i 30)cm. Povrch je jemně ochlupený. Pod zemí vytváří dřevnatý plazivý oddenek s mnoha výběžky. Lodyžní listy má střídavé, špičaté, tmavězelené, dlouhé 4cm, široké 1cm, mimo přízemní růžici přitisklé ke stonku s lopatkovým tvarem a spodní strana je bíle plstnatá. Bílorůžové nebo červené květy v úboru mají v průměru 0,6 - 1 (i 1,2)cm, jsou seskupeny do 3 - 12tičetném hroznu a zákrov je víceřadý s bělavými nebo narůžovělými listeny. Plodem je nažka délky 1,2 - 1,5mm s chmýrem délky 5 - 6mm. Patří mezi chráněné druhy C2. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aprica'
- 'Australis' - lodyhy stříbrošedé; úbory bílé
- var. *borealis* - úbory bílé
- f. *minima*
- 'Nyewood' - úbory tmavě růžové
- 'Roy Davidson'
- 'Rosea'/f. *rosea* - úbory růžové
- f. *rubra* - úbory růžové
- f. *tomentosa*

Vyhovují mu okraje listnatých lestů, pastviny, atp. Půda by měla být dobře propustná, písčitá, s kyselým pH.

Množí se dělením nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>