

Anthemis cotula (Rmen smrdutý)

synonyma: *A. subsp. psorosperma*, *Anthemis foetida*, *Anthemis psorosperma*, *Anthemis ramosa*, *Chamaemelum cotula*, *Maruta cotula*, *Maruta foetida*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Egypt, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nový Zéland, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v Evropě a severní Africe jako jednoletka. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 60 (i 90)cm. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, 2 - 3x zpeřené, na horní straně ochlupené, dlouhé (1,5 -) 2,5 - 5 (i 6)cm, široké 0,5 - 3cm a úkrojky jsou špičaté. Květenstvím je řidší úbor o průměru (1,2 -) 1,5 - 2,5 (i 3)cm na 3 - 12 (i 15)cm stopce, zákrovní lístky jsou eliptické až vejčité, dlouhé 3 - 4mm, široké 1,5 - 2mm, na vnější straně bíle ochlupené, lůžko je kuželovité, okvětní lístky bílé, dlouhé 0,5 - 1,4cm, široké 3 - 6mm a terče žluté. Plodem je nažka délky 1,2 - 1,6mm bez límečkovitého okraje.

Vyhovují mu úhory, okraje polních cest atp. v dobře propustné půdě.

<https://www.rostliny.net/>