

Arabis glabra (Huseník lysý)

synonyma: Turritis glabra

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Anglie, Arizona, Arkansas, Austrálie, Balkánský poloostrov, Britská Kolumbie, Connecticut, Černé moře, Česká republika, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, JV Asie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, S Afrika, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Skandinávie, Střední Asie, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v Evropě, Asii a severní Africe. Patří mezi dvouletky. Dorůstá výšky 0,5 - 1,1 (i 1,4)m. Barva rostliny je šedozelená. Stonek není větvený. Přízemní listy jsou obkopynaté modře ožíněné (při květu již zaschlé), výše položené kopinaté se střelovitou objímavou bází zdvižené vzhůru. Kvete béžovými nebo nažloutlými květy v hroznu po 25ks. Plodem je šešule. Semena jsou svrasklá. Dříve byla používána jako léčivka.

Vyhovují mu chudé písčité propustné půdy, okraje lesů, kapenité i vápenité půdy a teplá místa.

<https://www.rostliny.net/>